

Liječenje 157 bolesti pčelinjim proizvodima

Sadržaj:

ŠTA JE MED?.....	9
MED ŽIVOTNI LIJEK?.....	9
LIJEČENJE PČELINJIM PROIZVODIMA	11
AVITAMOZA.....	11
ADINAMIJA	11
AKNE MLADALAČKE (BUBULJICE)	11
ALERGIJA	12
ANGINA.....	12
ANGINA PEKTORIS	12
ARITMIJA.....	12
ARTEROSKLEROZA	13
ASTMA BRONHIJALNA.....	13
ASTMA SRČANA.....	14
ARTEROSKLEROZA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA	14
BIJELA SKRAMA – KATARAKTA.....	14
BOLOVI U ŽELUDCU – GASTRALGIJE	14
BRONHITIS ASTMATIČNI.....	14
BRONHITIS HRONIČNI.....	15
VAGINALNI I CERVIKALNI SEKRET	15
GASTRITIS HRONIČNI	15
GASTROENTEROKOLITIS	15
GLUHOĆA	16
GNOJNA UPALA PLUĆA	16
GNOJNA UPALA TKIVA.....	16

GONARTROZA	17
GRIP (INFLUENZA)	17
GUBITAK OSJEĆAJA MIRISA (ANOSMIA)	17
DERMATITIS.....	17
DIJABETES.....	17
DIZENTERIJA	18
EKCEM – ZAPALJENJE KOŽE	18
EPIDERMOFITIJA.....	18
EPILEPSIJA.....	18
ŽULJ.....	18
ZAOSTALOST U RAZVOJU DJETETA (HIPOTROFIJA).....	19
ZAPALJENJE BEŠIKE (CISTITIS).....	19
ZAPALJENJE VEZIVNOG TKIVA (FLEGMONA)	19
ZAPALJENJE VENA – TROMBOFLEBITITIS	19
ZAPALJENJE DEBELOG CRIJAVA – KOLITIS.....	20
ZAPALJENJE ZGLOBOVA –REUMATOIDNI ARTRITIS.....	20
ZAPALJENJE JAJNIKA (ANDEXITIS).....	20
ZAPALJENJE KARLIČNOG TKIVA (PARAMETRITITS).....	20
ZAPALJENJE KRAJNIKA (TONZILITIS)	21
ZAPALJENJE MLJEČNE ŽLIJEZDE (MASTITIS).....	21
ZAPALJENJE PANKREASA	21
ZAPALJENJE PLUĆNE MARAMICE	21
ZAPALJENJE PROSTATE – PROSTATITIS.....	22
ZAPALJENJE SLUZOKOŽE DESNI	22
ZAPALJENJE SLUZOKOŽE MATERNICE	22
ZAPALJENJE SLUZOKOŽE VAGINE (COLPITIS)	22

ZAPALJENJE TANKIH I DEBELIH CRIJEVA – ENTEROKOLITIS	22
ZATVOR	22
ZUBOBOLJA	23
IZOSTANAK MENSTRUACIJE (AMENOREJA)	23
IRITIS – ZAPALJENJE DUŽICE	23
IŠIJAS.....	23
KAMEN U BUBREGU.....	24
KAMEN U ŽUČNOJ KESI.....	24
KARIJES	24
KAŠALJ (TUSIS):	24
KIJAVICA	25
KIJAVICA VAZOMOTORNA	25
KIJAVICA POLENSKA	25
KLIMAKTERIJUM (KLIMAX)	25
KONJUKTIVITIS	26
KRVARENJE	26
KRVARENJE DESNI	26
KRVARENJE DISAJNIH PUTEVA	26
KRVARENJ IZ NOSA.....	26
LARINGITIS	27
LIŠAJI.....	27
LIŠAJI OTVORENO – RUŽIČASTI	27
LIŠAJI SKROFULOZNI.....	27
LIŠAJI FOLIKULARNI.....	27
LIŠAJI HRONIČNI	28
LUMBAGO	28

MALOKRVNOST – ANEMIJA.....	28
METRITIS.....	28
MIGRENA.....	28
MIKOZA	29
MIŠIĆNI BOLOVI – MIALGIJE	29
MIŠIĆNI UMOR – MIASTEMIJA	29
NEDOSTATAK APETITA – ANOREKSIJA	29
NEURALGIJA.....	30
NEIRALGIJA MEĐUREBARNA.....	30
NEURALGIJA TRIGEMINUSA	30
NEURITIS	30
NEURITIS MIŠIĆNOG SPLETA	30
NEUJRODERMITIS	31
NEUROZA	31
NEUROZA SRČANA.....	31
NOĆNO MOKRENJE.....	31
OBOLJENJE ZGLOBOVA – ARTROZNA BOLEST.....	32
OBOLJENJE JETRE – HEPATITIS.....	32
OŽILJCI OD RANA	32
OZLJEDE	32
OJED	33
OPADANJE KOSE	33
OPEKOTINE	33
OPŠTA SLABOST – ASTENIJA.....	33
OSTEOARTRITIS DEFORMIŠUĆI	33
OTALGIJA – BOLOVI U UŠIMA.....	34

OTVARANJE RANA NA KOŽI – DEKUBITIS.....	34
OTITIS SREDNJEG UHA	34
OTOMIKOZA- GLJIVIČNO ZAPALJENJE SLUŠNOG KANALA.....	34
OŠTEĆENJE MIOKARDA.....	35
PIODERMIJA	35
POVIŠEN KRVNI PRITISAK – HIPERTONIA	35
POLIARTRITIS	36
POLNA NEMOĆ – IMPOTENCIJA	36
PROLJEV – DIJAREJA	36
PROŠIRENJE BRONHIJA	36
PROŠIRENE VENE.....	37
PURITIS – SVRAB.....	37
PURITIS ANI.....	37
PURITIS VULVE	37
PSORIJAZA.....	37
RANE	37
RANE ATROFIČNE.....	38
RANE KONTUZNE I ISKIDANO-KONTUZNE	38
RANE OD POSJEKOTINA	38
RANE UBODNE	38
RANE OD UBODA PČELA	38
RAMICE NA GRLIĆU MATERICE	39
REUMATIZAM.....	39
SINUSITISI	39
SITNE GLISTE.....	39
SKLEROZA GENERALIZOVANA	39

SLABLJENJE VIDA.....	40
SNIŽEN KRVNI PRITISAK – HIPOTONIJA	40
SOR	40
SPONDILOARTROZA.....	40
STOMATITIS AFTOZNI.....	40
SKLEROZA GENERALIZOVANA	41
SLABLJENJE VIDA.....	41
SNIŽEN KRVNI PRITISAK – HIPOTONIJA	41
SPONDILOARTROZA.....	41
STOMATITIS AFTOZNI.....	42
TRAHEITIS, TRAHEOBRONHITIS.....	42
TRIHOFITIJA.....	42
TRIHOMONASNI URETRITIS.....	43
TRIHOMONAS VAGINALIS	43
TROVANJE	43
TUBERKULOZA KOŽE – VUKOJEDINA.....	43
TUBERKULOZA PLUĆA.....	43
TUMOR ZLOĆUDNI	44
UPALA DESNI GNOJNA	44
UPALA OKA.....	44
UPALA OĆNIH KAPAKA.....	44
UPALA SINUSA	44
UPALA OZUBLJA – PARADENTOZA.....	44
HEMOROIDI.....	45
HERPES.....	45
HIPERTROFIJA PROSTATE	45

HRONIČNO OBOLJENJE NOSA	45
CIROZA JETRE	46
CRVENI VJETAR	46
ČIREVI	46
ČIR NA DVANAESTOPALAČNOM CRIJEVU	46
ČIR NA ŽELUDCU	46

ŠTA JE MED?

Med je sladak i gust sok što ga pčele medarice tvore od nektara koji skupljaju na cvjetovima ili slatkim izlučevinama (medene rose) nekih kukaca. Med je i najsavršeniji proizvod prirode, u njemu se nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam.

Nektar koji pčele skupljaju iz cvijeća glavni je izvor ugljikohidrata koje pčele pretvaraju u lako probavljivi slador - glukozu i fruktozu, koji je glavni sastojak meda.

Zreli med ne sadrži više od 15% vode, a pčele ga u saću pokrivaju voštanim poklopcima i tako čuvaju od upijanja vlage i kvarenja. U medu se nalaze minerali, aminokiseline, visoko vrijedne organske kiseline kao što su mravlja, jabučna, limunska, octena, jantarna kiselina, pigmenti, razni derivati klorofila, vosak, inulin te elementi kompleksa vitamina B.

Med medljikovac sadrži 13 puta više mineralnih tvari od cvjetnog meda, a osobito željeza.

Svi dosadašnji pokušaji miješanja industrijske proizvodnje meda usprkos silnoj tehnologiji i uloženim ogromnim sredstvima dali su poražavajuće rezultate.

Tajnu proizvodnje pravog prirodnog pčelinjeg meda pčele nose u svom tijelu i organima za probavu koji taj proizvod pretvaraju u lijek gotovo nezamjenjiv u ljudskoj prehrani.

Nema na svijetu pčele koja proizvodi loš med, loš med rezultat je industrijskog punjenja meda ili lošeg nesavjesnog i neobrazovanog pčelara.

MED ŽIVOTNI LIJEK?

Med i drugi pčelinji proizvodi od davnina se koriste kao hrana i lijek, ali i za njegu i uljepšavanje lica i tijela. Med posjeduje svojstva koja ga čine nezaobilaznim dijelom zdrave prehrane, a zima bez meda i pčelinjih proizvoda nezamisliva je. **Ljekovitost meda ovisi o kvaliteti meda i o vrsti biljke iz koje je dobiven.** Posjeduje jedinstvenu strukturu, a koristan je zbog svojih antimikrobnih i antioksidativnih svojstava. Med je lako probavljiva namirnica koja trenutno vraća izgubljenu energiju, a dugotrajnom primjenom osigurava fizičku izdržljivost i psihičku stabilnost. Fitonutrijenti, koji se nalaze u sirovom medu i propolisu, pokazali su svojstva sprječavanja razvoja raka. Flavonoidi u medu, propolisu i peludu, u kombinaciji s ostalim lijekovima, značajno utječu na **prevenciju i liječenje tumora**.

Antioksidansi i flavonoidi imaju **antibakterijska svojstva**. Tamni med, osobito od kadulje, sadrži veće količine antioksidanata od ostalih vrsta meda. Svakodnevnom konzumacijom meda u krvi se podiže razina zaštitnih antioksidativnih sastojaka.

Med se prije svega u prošlosti koristio kao **izvor energije**. Još su u staroj Grčkoj u vrijeme Olimpijade sportaši jeli med i sušene smokve kako bi postigli što bolje rezultate. Stoga se naročito preporučuje sportašima zbog energije i stimulacije srca, kod umora i iscrpljenosti.

U narodnoj medicini poznato je da med pomaže kod ublažavanja simptoma tradicionalne gripe i prehlade. Nizom istraživanja dokazano je da je med najzdraviji zaslađivač za oboljele od dijabetesa tipa 2 i one s visokom razinom kolesterola.

Med poboljšava apsorpciju lijekova te povećava njihovu djelotvornost, a ujedno čisti organizam od štetnih tvari. Pomaže u liječenju gastritisa, čira na želucu, crijevnih infekcija, smanjuje lučenje želučane kiseline, pomaže u liječenju i detoksikaciji jetre. Danas se med koristi i kod ginekoloških problema, jutarnjih mučnina, bolesti respiratornog sustava, kao što su kronični bronhitis, bronhijalna astma, rinitis, alergijski rinitis, faringitis, sinusitis, laringitis. Isto tako, pomaže kod anoreksije ili gubljenja apetita, normalizira peristaltiku crijeva, uklanja opstipaciju i liječi hemoroide.

Savjeti za liječenje medom:

- Pijući rastopljeni med svi flekovi na crijevima potpuno se očiste.
- Jesti med znači imati izvanrednu snagu i pamćenje.
- Ako se med rastvor u toploj vodi i piće stvara se stolica.
- Ako se med rastvor u hladnoj vodi i piće zaustavlja se stolica.
- Kad se jede med stomak proradi i ne trebaju lijekovi za probavu.
- Onaj ko jede med ne može imati tvrdu stolicu niti može dobiti hemoroide.
- Upotreba meda pročišćava se krv i olakšava njen strujanje po tijelu.
- Med je jedini pravi lijek protiv lupanja srca.
- Med izaziva olakšanje u stomaku, a šećer izaziva tegobu.
- Med koji se piće vruć on se za 7 minuta miješa sa krvljom, a hladan za 20 minuta.
- Med otklanja bolove očiju. Čistim prstom med premazati preko očiju.
- Za malokrvne je med skladište krvi.
- Za bolesti kostiju med je vanredni lijek.
- Oboljeli od žutice ako ujutro i naveče jedu med za petnaest do dvadeset dana nestaje žutice.
- Med odstranjuje zakrčenje živaca.
- Nervoznim osobama i onima koje nemaju sna, jedući med smiruju se živci.
- Ako se med razmuti u slatkom mljeku ubija pantličare u crijevima.
- Ako med premažete preko zagrijanog platna i zavijete preko vrata i grla, bolovi u grlu odmah prestaju. To se radi kod angine i kod prehlade krajnika.
- Med se upotrebljava kao lijek protiv bolesti "stalnih angina" zagnojene rane. To mjesto treba odmah premazati medom, a bolesniku treba dati da jede med 5 do 10 puta. Odmah će se osjećati poboljšanje.
- Med kada se jede presijeca bolove u stomaku.
- Rane u crijevima i želucu med odmah liječi.
- Ako bole leđa ili kičma, mjesta gdje se osjećaju bolovi premažite sa medom, a preko toga pospite tucani biber u prahu. Tako držite tri dana. Ako ovu terapiju primjenjujete prvi put onda postupak ponovite nakon nekoliko dana i bolova će nestati. Kronični bolesnici trebaju ovu terapiju ponavljati najmanje jednom godišnje ili još bolje dva puta u godini za siguran rezultat.
- Ubod pčela je lijek protiv reume, treba povremeno dopustiti da pčela izujeda reumatično mjesto ili dio tijela gdje se osjeća reuma.

LIJEČENJE PČELINJIM PROIZVODIMA

NAPOMENA: Podaci koje možete ovdje pročitati uglavnom se preuzeti iz relevantne literature, najčešće iz knjige Apiterapija, Bugarskog liječnika dr. Mladenova koji je za svoj rad na polju apiterapije bio čak predložen i za Nobelovu nagradu. Pored njegovih djela, korištene su i knjige Nijaza Abadžića, Zvonka Čondića i drugih domaćih autora.

Za liječenje težih bolesti obavezno preporučujemo konsultovanje ljekara, ali je važno napomenuti da pčelinji proizvodi nemaju negativnih uticaja na ljudski organizam izuzev u slučaju preosjetljivosti (alergičnosti) na iste (radi se najčešće o polenu i pčelinjem otrovu)

AVITAMOZA

Oboljenja nastala kao rezultat nedostatka vitamina u hrani. Pčelinji proizvodi pored bogatog biološkog sadržaja šećera, mikroelemenata, enzima i organskih kiselina, sadrže i mnoge vrste vitamina koji se mogu koristiti kao koristan faktor u liječenju avitaminoze. Kod avitaminoza korisne su sve sorte meda i polena, te matična mlijec.

1kg meda, 22g polena i 10g matičnog mlijeca promiješaju se dobro i čuvaju se na tamnom mjestu u dobro zatvorenom sudu. Ako je med tečan, potrebno je da se prije svake upotrebe muti, jer polen izlazi na površinu smješe. Upotrebljava se 1 kašika 3 puta dnevno prije jela za odrasle a za djecu 1 kašičica rastvorena u čaši toplog mlijeka ili mlake vode. Konzumira se do postizanja željenog rezultata.

ADINAMIJA

Stanje gubitka snage, slabosti tijela uslijed napornog rad, bolesti ili starosti.

1kg meda, 10g matična mlijec i 200g polen miiješaju se do dobijanja homogene mase. Uzima se po 1 kašika 3 puta dnevno, rastvoren u čaši mlijeka ili mlake vode, 1 sat prije jela ili 3 sata poslije jela, u toku jednog mjeseca. U slučaju potrebe, liječenje se ponavlja.

AKNE MLADALAČKE (BUBULJICE)

Hronična dermatozna u mladim godinama, najčešće u vrijeme puberteta, nastala poremećajem rada lojnih žlijezda.

Medene maske od čistog meda. Oštećeno mjesto se dobro ispere topлом vodom i sapunom, nakon čega se nanosi tanak sloj meda. Poslije 1 sata koža se ispire samo topлом vodom. Mogu se praviti 2 tretmana dnevno a liječenje traje 10-15 dana. Alkoholni rastvor 30% propolisa se koristi za mazanje kože. Tretmani traju do ozdravljenja.

Preporučuje se za vrijeme liječenja unutrašnje (oralno) uzimanje meda kombinovanog , kod dječaka sa polenom (500g meda i 100g polen), a kod djevojčica sa matičnom mlijeci (500g meda i 1g matična mlijec). Liječenje ovim metodama daje bolje rezultate od liječenja medikamentima.

ALERGIJA

Bolesno stanje organizma koje dovodi do nenormalne reakcije tijela na određene podražaje. Predstavlja stanje smanjene otpornosti organizma (suprotno od imuniteta) a kod kontakta sa izazivačem alergije organizam burno reaguje. Pčelinji proizvodi posjeduju hiposenzitivno dejstvo imogu se koristiti u liječenju nekih alergijskih oboljenja (polensak kihavica, bronhijalna astma, koprivnjača itd.).

ANGINA

Gušobolja, zapaljenje zadnje strane farinksa i krajnika koje izazivaju koke a kao dodatni faktor utiče prehlada. Karakteristični su otežano žvakanje, govor i gutanje.

Preporučuje se: primjena meda (najbolje planinski, od majčine dušice ili lipov). Uzima se 1 kašičica svaka 3 sata u ležećem položaju, držeći med duže u ustima kako bi se resorbovao od strane sluzokože usta i iskoristio antibakterijski faktor (u želudcu se njegovo dejstvo smanjuje zbog želudčanih sokova). Dnevna doza za odrasle iznosi 100-120g a za djecu 1-2g po kg tjelesne težine

aerosolne, ultrazvučne ili parne inhalacije meda

kod gnojnih naslaga ili grudvica na tonsilama, pored navedenih procedura propisuje se i grgljanje 20%-nim rastvorom meda koja traju do njihovog uklanjanja.

angina se može liječiti i inhalacijom 5%-nim alkoholnim ekstraktom propolisa

ANGINA PEKTORIS

Stezanje grudi, napadi jakih bolova u oblasti srca sa širenjem u pravcu lijeve ruke, praćeni smrtnim strahom. Može biti izazvana sklerozom venskih sudova ili njihovim neurogenim grčevima. Kao siguran lijek preporučuju se med i matična mlječ.

Uzima se med (lavanda, livadski, nana, bagrem itd), 1-2g dnevno po kg tjelesne težine. Uzima se 4 puta dnevno rastvoren u čaši mlake vode, liječenje traje 1-2 mjeseca. Nakon prestanka bolova tretmani se moraju nastaviti u održavajućim dozama od po 1 kašičicu uveče i ujutru. Dobro je kombinovati med i matična mlječ. Matična mlječ se uzima po 100-200mg dnevno ujutro i u podne prije jela, ispod jezika ili može da se pomiješa sa medom i uzima po šemi uzimanja meda.

ARITMIJA

Aritmička srčana aktivnost kao rezultat patoloških izmjena u miokardu ili započete arteroskleroze venskih sudova. Često je izazvana nervnim faktorima, pretjeranim pušenjem i upotrebom kafe, čaja, brigama itd.

Pčelinji proizvodi, naročito med, zbog svog sastava vrše nezamjenljivu uslugu oslabjelom srčanom mišiću.

Kod aritmije se preporučuje dugotrajno uzimanje meda u dozama 100-200g dnevno, u 4 obroka, rastvoren u čaši mlake vode. Liječenje traje 1-2 mjeseca do normalne srčane aktivnosti. Med može da se kombinuje sa matičnim mlijecem i polenom u poznatim dozama.

ARTEROSKLOROZA

Starac̄ka bolest koja se ispoljava u vrtoglavici, slabljenju pamćenja, umoru, nemirnom snu, drhtanju udova.

Upotreba pčelinjih proizvoda smanjuje holestelor i masti u krvi, poboljšava funkciju srca i krvnih sudova, poboljšavaju san, apetit, pamćenje, vid, diurezu itd. Metode primjene su:

Med. U toku 1 mjeseca uzima se po 1-2g meda po kg tjelesne težine, podijeljeno u 4 obroka a poslije toga se prelazi u održavajuću dozu – 1 kašika ujutro i uveče prije jela u čaši mlake vode

matična mlijec , 100-200mg dnevno, ujutro i u podne prije jela, ispod jezika.

olen, 1 kašičica 3 puta dnevno u toku 1 mjeseca. Nakon toga pravi se pauza od mjesec dana i ponavlja liječenje.

pčelinji otrov. Preporučuju se ubodi pčela po šemi, kura uključuje 80-120 uboda.

ASTMA BRONHIJALNA

Alergijsko oboljenje sa karakterističnim napadima gušenja, kašljem, otežanim zviždajućim disanjem i povećanom produkcijom sekreta. Uzroci oboljenja su obično virusi i bakterije, ali ga mogu izazvati i polen, trave, dlake prašina itd.

Za liječenje se koriste med, propolis, pčelinji otrov i matična mlijec. Kod bolesnika sa alergijom infekcijsko – upalnog karaktera za liječenje najviše odgovara kraj proljeća, ljeto ili početak jeseni. Kod bolesnika sa oboljenjem izazvanim polenom, travama i biljkama dobra sezona za liječenje je kraj jeseni, zima ili početak proljeća. Tretmani počinju nakon utvrđivanja da li bolesnik ima alergiju prema pčelinjim proizvodima. Liječenje se sprovodi u periodu bez napada. Istovremeno sa inhalacijama, oralno se uzima odgovarajuća vrsta meda 100-120g dnevno u 6 obroka sa zadržavanjem u ustima. Pozitivan terapijski efekat u 95% slučajeva.

med. Primjenjuje se u vidu aerosolnih, ultrazvučnih i parnih inhalacija, lokalnih aplikacija, elektroforeze grudnog koša i oralnog uzimanja po šemi.

propolis u obliku tableta ili vodenog rastvora. Liječenje traje 30 dana.

pčelinji otrov. Koristi se direktni ubod, masti sa pčelinji otrovom i injekcije. Liječenje traje 6-10 nedjelja i obuhvata 250-500 uboda ili 5-8mg pčelinjeg otrova injekcijom u leđa između

plečki. Pozitivan rezultat u 86% slučajeva. Ovo se objašnjava uticajem otrova na hipofizno nadbubrežni sistem.

ASTMA SRČANA

Mahana lijevog ventrikulisa. Karakterističan je noćni bol, bolesnik se budi sa osjećajem gušenja i kašljem praćenim strahom, obliva ga hladan znoj. Liječenje je kao kod angine pektoris.

ARTEROSKLOROZA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA

Češće se razvija u krvnim sudovima nogu. Simptomi su osjećaj hladnoće i utrnulosti udova. Kasnije se pojavljuju bolovi u oblasti listova.

Preporučuju se liječenje pčelinjim otrovom zbog njegovog dejstva na širenje krvnih sudova, analgetičnog dejstva, jačanje kolateralnog krvotoka i antisklerotičnog dejstva. Takođe se može liječiti i pomoću matične mlijeci u dozi od 100-200mg dnevno u 2-3 obroka. U terapiju se može uključiti i propolis oralno ili spoljno, kao i polen u poznatim dozama.

BIJELA SKRAMA – KATARAKTA

Zamućenost očnog sočiva. Može biti naslijeđenog, urođenog ili sekundarnog karaktera (uslijed traume, dijabetesa, starosti, tetanusa itd).

Liječenje se sprovodi medom a proces je dugotrajan. Med se 3-4 puta dnevno stavlja ispod donjeg očnog kapka staklenim štapićem. Osjeća se slab bol, lučenje suza, crvenilo. Svakih 20 dana liječenja pravi se pauza od 3-10 dana.

BOLOVI U ŽELUDCU – GASTRALGIJE

Nestalni bolovi u želudcu, najvjerovaljnije neurogenog porijekla.

Za sprječavanje bola preporučuje se uzimanje 20-40 kapi 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa ili 1 kašike 10%-nog vodenog ekstrakta propolisa. Kod čestih bolova potrebno je sistematsko uzimanje 30-40 kapljica u čaši svježeg mlijeka ili vode 3 puta dnevno, prije jela , u toku 20 dana.

BRONHITIS ASTMATIČNI

Rani oblik bronhijalne astme praćen napadima kašlja, najčešće noću. Infekcijsko – upalnog je karaktera a liječi se kao i bronhijalna astma sa pozitivnim efektom u 89% slučajeva.

BRONHITIS HRONIČNI

Zapaljenje sluzokože bronhija kao rezultat infekcija ili profesionalnih oštećenja. Simptomi su kašalj, tegobe u grudnom košu, obilan ispljuvavak, brzo zamaranje, zviždajuće disanje itd.

Liječenje se vrši inhalacijom meda ili voštano-propolisove smješe u odnosu 8:2, uz oralno uzimanje meda propolis šemi. i mazanje grudnog koša smješom meda i brašna od poljske gorušice (5:1 u korist meda). Narodna medicina još preporučuje:

rotkva. Izdubi se unutrašnjost i puni se medom. ostavlja se nekoliko dana i poslije se uzima po 1 kašika 3 puta dnevno

- med promiješan sa nastruganim hrenom
- med od bora rastvoren u vodi u kojoj su kuhane jelove šišarke
- med sa tahan-halvom u odnosu 1:1, 3 puta dnevno po kašika
- med rastvoren u čaju od ljubičice i žalfije

VAGINALNI I CERVIKALNI SEKRET

Sluzava gnojna izlučevina iz ženskih polnih organa, rezultat upalnih procesa u vagini i grliću maternice, praćeno svrabom.

Liječenje je jeftino, brzo i efikasno. Primjenjuju se lokalne aplikacije meda ili propolisa koji se pomoću tampona uvode u vaginu. Liječenje traje 5-6 tretmana.

GASTRITIS HRONIČNI

Zapaljenje želudčane sluzokože praćeno poremećajem sekretoorne i pokretačke funkcije želudca.

Propisuje se oralno uzimanje meda, 1-2g po kg tjelesne težine, 3 puta dnevno. Pri hiperacidnom gastritisu med uzimati 2 sata prije jela a pri hipoacidnom uzimati ga u mlakoj vodi 10 minuta prije jela. Liječenje tarje 20-30 dana.

Liječenje se može vršiti i propolisom. Uzimati po 20 kapljica 3 puta dnevno prije jela u časi tople vode. Liječenje traje 3-4 sedmice a bolovi nestaju već nakon 6-7 dana.

GASTROENTEROKOLITIS

Zapaljenje sluzokože probavnog kanala – od želudca do debelog crijeva. Simptomi su nabreklost stomaka, kolike, zatvor, dijareja, glavobolja i td.

Liječenje se može vršiti medom, polenom ili propolisom, a najbolje je kombinovati sva tri proizvoda.

med. Prikladne sorte: od kestena, nane, livadski, planinski, ...uzima se po kašika 3 dnevno prije jela rastvoren u toploj vodi. Liječenje traje 4-5 sedmica.

propolis. Uzima se 3 puta dnevno prije jela po 1-2 kašike 10%-nog vodenog ekstrakta propolisa ili po 30-40 kapljica 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa u čaši vode ili mlijeka.

polen. 3 puta dnevno po kašika prije jela.

GLUHOĆA

Radi se o stečenoj gluhoći, nastaloj uslijed šuma, vibracija, kontuzija, akutnih i hroničnih otitisa, infekcijskih oboljenja i dr.

Za liječenje se koristi 30-40%-na alkoholna emulzija propolisa u mješavini sa biljnim uljem (maslinovim ili kukuruzovim) u koncentraciji 1:4. prije upotrebe dobro promućkati, a zatim tamponom nanijeti emulziju u ušni kanal. Tampon ostaje u uhu 10-12 sati kod djece, 36-38 sati kod odraslih. Liječenje traje 10-12 tretmana.

GNOJNA UPALA PLUĆA

Razvija se sa simptomima gripa, bronhitisa, pneumonije. Poslije toga se pojavljuju gnojni bronhijalni sekret, temperatura, kašalj i nedostatak apetita.

Propisuje se oralno uzimanje 100-120g meda dnevno u 3 obroka. Dolazi do brzog smanjenja količine ispljuvka, popuštanja kašlja, vraćanja apetita, povećanja tjelesne težine. Istovremeno se propisuje uzimanje po 30-40 kapljica 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa u čaši mlake vode ili mlijeka. Liječenje kombinovati sa antibioticima jer med višestruko uvećava aktivnost biotika.

GNOJNA UPALA TKIVA

Upalni proces izazvan brojnim mikroorganizmima, pri čemu se skuplja gnoj u tkivima na određenom mjestu.

Koristi se jedan od pčelinjih proizvoda ili njihova kombinacija:

med se maže u debelom sloju preko ognojenog tkiva i prekriva zavojem od sterilne gaze. Zavoj se mijenja svaki dan med zaustavlja razvoj upalnog procesa, pomaže brzo probijanje rane i isticanje gnoja, te ubrzava zarastanje tkiva. propolis. U čistom obliku se malo zagrije i stavi kao flaster na ranu i pričvrsti zavojem Apces se brzo otvara, gnoj ističe a rana ozdravljuje.

Pčelinji vosak. Koristi se kao i propolis.

miješanje jednakih količina meda i brašna. Dobijeno tijesto se stavi na lanenoj krpi na bolesno mjesto. Mijenja se svakog dana.

GONARTROZA

Degenerativni i produktivni procesi na kostima i hrskavici zglobova koljena. Ovi procesi vode do deformacije zglobova, ograničavanja pokreta, bolova i oteklina.

Kao terapija se primjenjuje pčelinji otrov na neki od navedenih načina. Liječenje traje 20-40 dana.

GRIP (INFLUENZA)

Med, propolis i matična mlječ posjeduju antivirusno dejstvo. Preporučuje se po 2 kašike meda, 100mg matične mlječi i 30 kapljica 30%-nog alkoholnog ekstrakta dnevno uzimati oralno. Dobro je prilikom epidemije gripa svakodnevno mazati nosnu sluzokožu matičnom mlječu.

protiv gripa mazanje sluzokože nosa i uzimanje kašike meda i bijelog luka (oljušteni bijeli luk se istuca, protrlja i miješa sa istom količinom meda), rastvorene u čaši tople vode, 2-3 puta dnevno.

GUBITAK OSJEĆAJA MIRISA (ANOSMIA)

Jednostrano ili obostrano gubljenje osjećaja mirisa izazvano patološkim procesima u nosnoj duplji.

Preporučuju se aerosolne i ultrazvučne inhalacije meda, te aplikacije meda u nozdrve. Radi smanjenja draženja, medu se dodaje 5% anestezina.

DERMATITIS

Kod banalnih oblika dermatitisa izazvanih streptokokama, stafilokokama i drugim bakterijama med i propolis imaju povoljan terapijski efekat. Oštećeno mjesto se maže medom ili 20%-nom propolisom mašcu ili 30%-nim alkoholnim ekstraktom propolisa. U slučaju potrebe se pravi zavoj.

DIJABETES

uzrok oboljenju je nedovoljno lučenje sekreta pankreasa ili disfunkcije prednjeg dijela hipofize. bolesnik ima povećan sadržaj šećera u krvi i mokrači, često urinira i osjeća žeđ.

Propisivanje meda je dobra terapijski potez, zahvaljujući fruktozi i mikroelementima koji djeluju slično inzulinu i stimulišu pankreas u produkciji hormona. Liječenje se vrši pod kontrolom ljekara. Dio ugljenih hidrata zamjenjuje se medom u količini 40-50g u 4 obroka. Prikladne su sorte sa većim sadržajem fruktoze i vitamina (bagremov, od djeteline, suncokreta, lucerke itd.). kada se krvni šećer normalizuje, lijekovi protiv dijabetesa se postepeno smanjuju i ostavljaju.

DIZENTERIJA

Zarazna bolest crijeva praćena obilnom krvavom dijarejom (prolivom). Može biti amebna, bacilna i dizenteriformna.

Med koji senađe u crijevima predstavlja hranljivu sredinu za Lastobacillus viridus koji oksiduje mlijiečnu kiselinu i noramlizuje crijevnu floru, mijenja negativnu okolinu u kojoj žive dezinterijske bakterije i brzo ih uništava. Za dizenteriju kod djece preporučuje se 30-60g meda dnevno, kod odraslih duplu dozu.

EKCEM – ZAPALJENJE KOŽE

Ekcem je najčešća dermatozna – zapaljenje kože koje može biti hronično ili akutno.

Med i propolis daju pozitivan terapijski efekat kod liječenja ekcema. Medom se mažu ili previjaju oštećena mjesta a istovremeno se oralno uzima 60-100g medadnevno podijeljeno u 3 obroka. Propolis se primjenjuje u vidu 15%-ne propolisove masti ili 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa kojim se maže oštećeno mjesto i po potrebi stavlja zavoj. Oralno se uzima 20-40 kapljica propolisa u čaši vode, 3 puta dnevno. Liječenje traje do izlječenja.

EPIDERMOFITIJA

Kožna bolest izazvana gljivicama koje parazitiraju po koži čovjeka.

Na žarište upale nanese se u debelom sloju propolisova mast, prekrije flasterom i ostavi da stoji 5-7 dana. Kod svih bolesnika postignut je pozitivan efekat.

EPILEPSIJA

Liječenje ove teške bolesti pčelinjim proizvodima nije široko ispitano. Neki izvori tvrde da se potpuno izlječenje može postići ubodima pčela, a ima pozitivnih iskustava ako se pije sok od celera ponješan sa medom prije jela. U svakom slučaju, med ne izaziva kontraindikacije i ne može naškoditi.

ŽULJ

Organsko izrastanje rožnog sloja ćelija kože, uključujući i duboke slojeve kože, obično konusnog oblika.

Liječenje se vrši propolisom očišćenim od primjesa. Pravi se topla kupka za noge sa žuljem. Omekšalo tkivo se zatim ukloni sterilnom igлом a povrh žulja se stavi tanak sloj zagrijanog propolisa koji se fiksira flasterom ili zavojem i ostavi da odstoji 4-5 dana. Tada se skida zavoj i ponovo pravi topla kupka. Obično se poslije ove procedure žulj zajedno sa korijenom uklanja bezbolno, ako ne onda se procedura ponavlja.

ZAOSTALOST U RAZVOJU DJETETA (HIPOTROFIJA)

Zaostalost u razvoju djeteta: mala težina, nizak rast, slab apetit, nemiran san, malaksalost, starački izgled.

Matična mlijec postiže brz terapijski efekat. Uzima se pomiješana se medom, sa zadržavanjem pod jezikom. Liječenje traje 20-30 dana. Svojim sadržajem matična mlijec normalizuje razmjenu materija i olakšava regenerativne procese, ubrzava rastenje.

ZAPALJENJE BEŠIKE (CISTITIS)

Najčešće je izazvano bakterijskim infekcijom. Predisponirajući faktiri su uretritis, prostatitis, kamen u bešici idr. Simptomi: često mokrenje, bolovi, napetost a ponekad i hematurija.

Med, propolis i polen predstavljaju efikasno sredstvo za liječenje cistitisa. Liječenje traje 20-30 dana. 1kg meda, 200g polen i 50g propolisa u prahu se dobro izimiješaju. Uzima se po 1 kašika u čaši mlake vode 3-4 puta dnevno prije jela. Već poslije 5-6 dana simptomi postepeno popuštaju, mokrača se normalizuje.

ZAPALJENJE VEZIVNOG TKIVA (FLEGMONA)

Predstavlja lokalno akutno gnojno zapaljenje vezivnog tkiva (potkožnog, međumišićnog) neograničeno opnom. Izazivaju ga mikroorganizmi.

Za liječenje ovih zapaljnjva uspješno se koristi mazanje propolisove masti.

ZAPALJENJE VENA – TROMBOFLEBITITIS

Oboljenja vena uglavnom donjih udova. To je upalni proces koji obuhvata zidove vena, u lumenu se formatična mlijeciraju trombovi koji su sastavljeni od bijelih, crvenih ili miješanih krvnih ćelija.

Za liječenje ove bolesti primjenjuje se pčelinji otrov u vidu pčelinjih uboda, injekcija ili masti sa pčelinjim otrovom. Pčelinji otrov ima antikoagulativno, anestetično, protivupalno i vazodilatorno (širenje krvnih sudova) dejstvo.

ZAPALJENJE DEBELOG CRIJEVA – KOLITIS

Karakteristični su bolovi kolike, meteorizam, otečenost stomaka, česte stolice sa sluzi i gnojem.

Liječenje se vrši na jedan od slijedećih načina:

med. Dnevna doza 100-120g podijeljeno u 3 obroka, rastvoren u čaši mlake mineralne vode, piće se 1-2 sata prije jela. Liječenje traje 20-30 dana a po potrebi ponavlja se za 1-2 mjeseca.

Propolis. Koristi se 30%-ni alkoholni ekstrakt propolisa, po 20-40 kapljica 3 puta dnevno, sat prije jela u čaši mlake vode ili mlijeka. Liječenje traje 20-30 dana.

Polen. Uzimati po 1 kašiku polena prije jela 3 puta dnevno.

Kombinovano. 500g meda se pomiješa sa 100g polena i 50g dobro istucanog propolisa, miješa se do dobijanja jednolične mase. Uzima se po kašika 3 puta dnevno, 1-2 sata prije jela, rastvoreno u mineralnoj vodi.

ZAPALJENJE ZGLOBOVA –REUMATOIDNI ARTRITIS

Artritis je zapaljenje zglobova na infekcijsko-alergijskoj osnovi.

Poznato i priznato je je dejstvo pčelinjeg otrova kod ovog oboljenja. Koriste se slijedeće metode:

- utrljavanje u kožu u vidu masti
- putem potkožnih ili intradermalnih injekcija
- putem elektroforeze

putem pčelinjih uboda. Počinje biološkom probom. Broj uboda se postepeno povećava. Ukupni broj uboda je 120-150 nakon čega se pravi pauza a u slučaju potrebe liječenje se nastavlja za 6 mjeseci.

ZAPALJENJE JAJNIKA (ANDEXITIS)

Najčešće je izazvano mikroorganizmima krvnim ili linfnim putem.

Kada terapija medikamentima ne daje rezultate, primjenjuje se elektroforeza medom ili ultrazvuk propolisovom mašću (obje terapije se sprovode u klinikama).

ZAPALJENJE KARLIČNOG TKIVA (PARAMETRITITS)

Zapaljenje vezivnog tkiva koje je vezano za grlić maternice izazvano bakterijama.

- Preporučuje se elektroforeza medom. Liječenje traje 20 dana po 1 tretman dnevno.

ZAPALJENJE KRAJNIKA (TONZILITIS)

Izaziva se bakterijama. Predisponirajući momenti su prehlada i promjene vremena. To je jdna od najžešćih žarišnih infekcija u uskoj vezi sa reumatizmom, bubrežnim, srčanim, plućnim i drugim bolestima. Može biti bez simptoma ili sa bolovima u grlu, neprijatnim zadahom, suhim kašljem isl.

Liječi se ušećerenim planinskim medom ili medom u saću. Uzima se po kašičiva na svaka 3 sata u ležećem položaju sa zadržavanjem u ustima. Krajnici se tuširaju sa 20%-nim alkoholnim ekstraktom propolisa, 1-2 puta dnevno. 2-3 puta dnevno se grglja 20%-nim vodenim ekstraktom propolisa kome se doda kašičica meda. Liječenje traje do ozdravljenja, obično 5-10 dana.

ZAPALJENJE MLIJEČNE ŽLIEZDE (MASTITIS)

Gnojno zapaljenje mliječne žljezde, najčešće za vrijeme laktacionog perioda kod žene.
Liječenje:

Zavoj sa medom obogaćenim do 10% propolisom stavi se na žarište upale. Tretmani se prave svakodnevno ili svakog drugog dana.

Žarište upale previje se 15%-nom propolisovom mašcu ili mješavinom 40%-ne alkoholne emulzije propolisa i ribljeg ulja u odnosu 1:1

ZAPALJENJE PANKREASA

Simptomi su karakteristični bolovi u epigastrijumu, nadutost stomaka, dijareja itd.

Liječi se 40%-nim alkoholnim ekstraktom propolisa, po 20-40 kapljica 3 puta dnevno, 1 sat prije jela. Postiže dobre terapijske rezultate.

ZAPALJENJE PLUĆNE MARAMICE

Najčešće je izazvano bakterijama, predisponirajući faktori su prehlada, bronhitisi itd.

Preporučuje se liječenje pčelinjim otrovom i drugim ljekovitim mastima koje se utrljavaju kroz kožu 2 puta dnevno. Bolovi brzo popuštaju i razvoj bolesti se sprječava.

obloge od meda i brašna od slaćice u oblasti oboljele strane na lanenoj krpi. Istovremeno, oralno uzimati po 100-200g meda u najmanje 3 obroka.

ZAPALJENJE PROSTATE – PROSTATITIS

Zapaljenje prostatne žljezde, bakterijskog ili protozojnog karaktera. Pacijent osjeća bolove i težinu u oblasti perineuma, često mokri pri čemu osjeća pečenje, mlaz je tanak, pojavljuju se polni poremećaji. Preporučuje se :

dnevno uzimanje 100-150g meda obogaćenog 20%-nim polenom, raspoređeno u 4 obroka. Smjesa se rastvara u mineralnoj vodi i pije prije jela. Poželjno je dodati smješi 1% matična mlijec

30%-ni alkoholni ekstrakt propolisa s uzima u količini od 30-40 kapljica 3-4 puta dnevno prije jela. Dobro je kapljice stavljati u smjesu meda i polena.

ZAPALJENJE SLUZOKOŽE DESNI

Opšte zapaljenje sluzokože desni i usne šupljine, pri čemu se osjeća pečenje, bolovi, obilno lučenje pljuvačke, suha usta, loš zadah.

Preporučuje se ispiranje usta 5%-nim vodenim ekstraktom propolisa svaka 2-3 sata.

ZAPALJENJE SLUZOKOŽE MATERNICE

Tretmani se vrše pčelinjim ubodima u oblasti stomaka (nisko) i lumbalnoj oblasti. Liječenje traje 3-4 sedmice.

ZAPALJENJE SLUZOKOŽE VAGINE (COLPITIS)

Bolesnica osjeća svrab, pečenje, obilno luči sekret.

Med daje 100% efekt prilikom lokalnih vaginalnih aplikacija tamponom ili elektroforezom. Liječenje traje 5-10 dana a bolje je koristiti ušećeren med.

ZAPALJENJE TANKIH I DEBELIH CRIJAVA – ENTEROKOLITIS

Obično nastaje zbog bakterijske infekcije, upotrebe jake i začinjene hrane, loše sažvakane hrane itd. simptomi: otečenost stomaka, kolike, zatvor a poslije toga proliv. Lijeći se kao i medmedmedmed

ZATVOR

Uzrok je slabost nervno-mišićnog aparata crijeva, stomačne prese i dijafragme.

Lijeći se medom, jer on stimuliše tonus mišića i funkcije glatkih mišića, kao i stomačno – crijevnu sekreciju. Uzima se rastvoren u mlijeku ili u mlakoj vodi 60-120g dnevno u nekoliko

obroka, obavezno uveče prije spavanja. Polen takođe normalizuje stomačno- crijevne funkcije.

ujutro i uveče uzimanje kašike meda rastvorenog u čaši kozjeg mlijeka, ili uveče prije spavanja med u čaju biljke Cassia angustifolia.

ZUBOBOLJA

Efikasno sredstvo protiv zubobolje je propolis koji posjeduje anestetična, protivupalna i regenerativna svojstva, a takođe i zaustavlja krvarenje. Može se koristiti u prirodnom vidu (lijepiti kao flaster na zub), vata umočena u propolisov ekstrakt ili ispiranje usta 5%-nim vodenim ekstraktom propolisa. U svakom slučaju, bolovi prestaju za oko 15 minuta.

IZOSTANAK MENSTRUACIJE (AMENOREJA)

Misli se na izostanak menstruacije u godinama kada bi normalno trebala da postoji. Razlog su najčešće endokrini poremećaji u jajnicima. Preporučuje se slijedeće liječenje:

1kg meda miješa se sa 200g polena i uzima se duže vremena po 1 kašika 3 puta dnevno prije jela.

matična mliječ po 100-200mg dnevno se stavi pod jezik prije jela. Uzima se 1-2 mjeseca uz istovremeno uzimanje meda i polena

IRITIS – ZAPALJENJE DUŽICE

Zapaljenje irisa u oku, najčešće zbog lokalnih infekcija i reumatizma. Iris malo oteče, zjenica se skuplja i sporo reaguje na svjetlost.

- Liječenje se vrši mastima od pčelinjeg otrova, ubodima pčela ili injekcijama između plećki.
- Liječenje kombinovati sa oralnim uzimanjem meda, polena, propolisa i matična mliječi.

IŠIJAS

Neuritis ili neuralgija sjednjačkog živca. Uzroci mogu biti prehlada, umor, trauma itd.

Dobri rezultati se postižu liječenjem pčelinjim otrovom. Ubodi pčela duž ovog živcapočinju sa ubodom jedne pčele a zatim se svaki dan povećava broj uboda za 1 do 8-10 uboda po jednoj seansi. Jedna kura liječenja obuhvata 150-200 uboda. Pčelinji otrov se može ubrizgavati injekcijom u bolnom području.

KAMEN U BUBREGU

Poznato je da pčelinji otrov rastvara zrnaca pijeska i kamena u bubrežima. Pored pčelinjih uboda, bolesnom se može davati i maslinovo ulje pomiješano sa medom i sokom limuna (odnos 1:1:1) po 1 kašika 3 puta dnevno. Preporučuje se i istovremeno uzimanje 20%-nog vodenog ekstrakta ili 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa u čaši vode ili mlijeka.

i čaj od crvene borovnice (20 g lišća kuha se u čaši vode a zatim miješa sa 20g meda i pije 3 puta dnevno).

KAMEN U ŽUČNOJ KESI

Poremećena razmjena holesterola izaziva formiranje kamena u žuči. Karakteristični su bolovi u oblasti žučnog mjehura, otečenost stomaka, gađenje i povraćanje.

Sastoјci meda smanjuju sadržaj masnoće u jetri i potpomažu lučenje i protok sekreta iz žuči. Za čišćenje žuči od pijeska ili kamena mješavinu meda i maslinovog ulja u omjeru 1:1 (po 1 kašika prije jela) ili istu kombinaciju sa sokom od limuna (po 1 kašika 4-5 puta dnevno). Za uklanjanje bola uzima se 20%-ni alkoholni ekstrakt propolisa 3 puta dnevno prije jela. Preporučuje se takođe uzimanje matične mlijeci i polena u normalnim dozama.

KARIJES

Oboljenje zuba čiji je uzrok loša higijena, nepunovrijedna ishrana ili anaerobne bakterije.

Kao sredstvo za uklanjanje bola uzima se 5-10%-ni alkoholni ekstrakt propolisa. Tamponi sa propolisom stavljuju se u šupljinu zuba, bol prestaje a dalje liječenje vodi zubar.

KAŠALJ (TUSIS):

250g meda i sitno nastrugani hren se miješaju i uzima se po kašika prije jela

120g lanenog sjemena u vezanoj platnenoj vreći se kuhau 1l vode, zatim se cijedi i vodi dodaje sok od 1 limuna i 500g meda, uzima se po kašika prije jela.

čaša meda se pomiješa sa 1 kašikom samljevene biljke Arum maculatum, dodaje se sok od 1 limuna, 1 kašika šлага i dobro se izmiješa. Uzima se po kašika prije jela 3 puta dnevno

Izdubi se unutrašnjost i puni se medom. Ostavlja se nekoliko dana i poslije se uzima po 1 kašičica 3 puta dnevno (preporuka kod velikog kašlja)

500g crnog lukase veoma sitno nastruže i kuha na slaboj vatri u 1l vode 3 sata. Stavi se 100g meda a onda se smjesa sipa u flašu i dobro zatvori. Uzima se po kašika 4-5 puta dnevno

KIJAVICA

Izazivači su različiti virusi i patogene bakterije.

U liječenju se koriste med, propolis i matična mlijec. Matična mlijec se uglavnom primjenjuje kod virusnih rinitisa: nekoliko puta dnevno se stavi pod jezik 100-200mg dnevno. Med se koristi za stavljanje u nozdrve 2 puta dnevno. Mogu se koristiti i inhalacije propolisa ili stavljanje tampona sa 20%-nim vodenim ekstraktom propolisa. Ako je upalni proces zahvatio i grlo, liječenje treba kombinovati sa oralnim uzimanjem meda po 1 kaščica 6 puta dnevno, sa zadržavanjem u ustima.

KIJAVICA VAZOMOTORNA

Karakteristično je često kihanje, lučenje bistre tečnosti iz nosa i otežano disanje. Uzroci su mehanički, termički, psihičke traume, klimatski faktori itd.

Dobri rezultati u liječenju ove bolesti postižu se aerosolnom ili parnom inhalacijom meda i propolisa, te stavljanje meda u nozdrve. Obavezno kombinovati sa oralnim uzimanjem meda sa zadržavanjem u ustima.

KIJAVICA POLENSKA

Iznenadno oboljenje sezonskog karaktera koje izaziva polen u periodu cvjetanja biljaka. Prvo se javlja osjećaj golicanja u nosu i grlu, glavobolja, kihanje, zapušavanje nosa i bistar sekret.

Liječenje se vrši inhalacijom meda u sezoni kada nema napada. Preporučuje se da med bude iz oblasti u kojoj bolesnik živi.

KLIMAKTERIJUM (KLIMAX)

Nastaje kod žena nakon 40 godina starosti i ima endokrinu etiologiju. Simptomi: talasi vrućine, preznojavanje, nesanica, psihički poremećaji itd.

Za liječenje se koristi matična mlijec, med i polen:

matična mlijec se uzima po 100-200mg dnevno, ujutro i upodne prije jela, ispod jezika.

1kg meda, 200g polena i 10g matična mlijeca pomiješaju se u jednoličnu masu. Uzima se po kašiku 3 puta dnevno prije jela.

KONJUKTIVITIS

Zapaljenje konjuktive (sluzokože oka) izazvano infekcijom, prašinom, dimom i sl.

1-2 kapljice svježeg i tečnog meda se stavljuju u oko 3-4 puta dnevno. Ako pacijent osjeća kako nadraživanje med se može razrijediti 1:1 sa destilovanom ili prokuhanom vodom. Liječenje traje 5-15 dana.

na isti način se primjenjuje propolisova voda – 20%. Bolovi prolaze već prvog dana.

KRVARENJE

Kod lakih , banalnih krvarenja (od pzljeda, posjekotina, kontuzija i drugih kožnih rana) krv se zaustavlja brzo pomoću vate umočene u 10-20%-ni alkoholni ekstrakt propolisa. Ako se stavi na oštećeno mjesto zaustavlja krv za 2-3 minuta a nakon isparavanja alkoholana površini rane se stvara zaštitna kora od propolisa. Bolovi brzo popuštaju a istovremeno nastaje i regeneracija oštećenih tkiva i ozdravljenje.

KRVARENJE DESNI

Ispiranje usta 5 % vodeno alkoholnom emulzijom propolisa ili 10 % vodenim ekstraktom propolisa ili tretiranje desni 30 % alkoholnim ekstraktom propolisa.

500 g meda pomiješati sa 100 gr polena. Uzimati po jednu kašičicu 6 puta dnevno sa zadržavanjem u ustima. Liječenje traje do ozdravljenja.

KRVARENJE DISAJNIH PUTEVA

Kod raznih krvarenja disjanih puteva oralno uzimati kuglice propolisa veličine zrna pasulja 3 puta dnevno; 20 % propolis ovu vodu – 1 kašika 3 puta dnevno; 30 % alkoholni ekstrakt propolisa – 20-40 kapljica 3 puta dnevno u čaši mlijeka ili vode. Preporučuje se još oralno uzimanje meda i polena u normalnim dozama.

KRVARENJ IZ NOSA

Krvarenje iz nosa najčešće za vrijeme akutnih ili hroničnih rinitisa pri čemu pucaju kapilari. Tampon umočen u 10 % rastvor propolisa ili 50 % mednom rastvoru zaustavlja krvarenje.

LARINGITIS

Upalno oboljenje glasnih žica, bakterijske, mehaničke ili hemijske prirode ili usljed prehlade.

- oralno uzimanje meda 100 – 120 g dnevno 1 kašičica svaka 3 sata
- aerosolne ili parne inhalacije meda 2 puta dnevno
- grgljanje 2 % vodenim alkoholnim ekstraktom propolisa 4-5 puta dnevno
- Kura liječenja traje 12- 20 dana, a kod svih bolesnika dolazi do poboljšanja.

LIŠAJI

Kožna bolest kod koje se formiraju papulozni ospipi koji čuvaju svoj morfološki oblik sve dok bolest traje. Ovi osipi se ne mijenjaju, ne pretvaraju se u pustule i mjeđujriće.

- Pomiješa se 25 g meda, 25 g bademovog ulja i 0,25 g salicilne kiseline, i time se maže oštećeno mjesto.
- Kao ljekovito profilaktičko sredstvo može se koristiti i sljedeća smjesa : 100 g meda, 20 g bijelog voska, 5 g ribljeg ulja, 50 g ricinusovog ulja, 20 g glicerina i 1 g sumpora sa nekoliko kapljica esencije. Oštećeno mjesto se maže 1-2 puta dnevno.

LIŠAJI OTVORENO – RUŽIČASTI

Oboljenje kože sa otvorenou ružičastim pljosnatim svrbećim čvorovima.

Uspješno se liječe spojnim tretiranjem propolisovom mašću ili alkohol – glicerin – propolisovim ekstraktom.

LIŠAJI SKROFULOZNI

Šiljati čvorovi uglavnom na koži stomaka, pokriveni sivo bijelim ljuspicama.

Više puta dnevno žarišta se tretiraju 50 % alkoholnim ekstraktom propolisa ili se mažu 30 % propolisovom mašću koja se prekriva flasterom. Liječenje traje do ozdravljenja.

LIŠAJI FOLIKULARNI

Sitni upalni čvorovi oko korijena dlačica sa ljuspicom ispod koje se nalazi presavijena dlaka.

Maže se 1 – 2 puta dnevno 30 % propolisovom mašću ili 30 % alkoholnim ekstraktom propolisa.

LIŠAJI HRONIČNI

Osipi u obliku čvorova na nervnoj bazi.

Više puta dnevno mazati oštećena mjesta 20 % medeno – propolisovom mašću; 100 g meda se miješa sa 20 g propolisa , usitnjenog i u prah prosijanog dok se ne dobije jednolična masa.

LUMBAGO

Oboljenje mišića u lumbalnoj oblasti. Izazvano je najčešće prehladom, traumatskim i mehaničkim faktorima, kao i infekcijama. Lijeći se na sljedeće načine :

pčelinji otrov. Primjenjuje se u vidu direktnih uboda po poznatim šemama, injekcija, masti, elektroforeze ili uvođenja pčelinjeg otrova putem ultrazvuka. Liječenje traje 5 – 15 dana i daje odlične rezultate.

voštano – propolisove termalne aplikacije na lumbalnu obnlast.

med pomiješan sa jednakom količinom slačicinog brašna. Stavi se na laneno platno i fiksira na žarište bola, najbolje uveče prije spavanja.

MALOKRVNOST – ANEMIJA

Malokrvnost je smanjenje sadržaja hemoglobina (željeza) i crvenih krvnih zrnaca u krvi. Bolesnici se žale na umor, ubrzano lupanje srca, vrtoglavica, nedostatak apetita, nesanice i glavobolje. Pčelinji proizvodi (med, polen i matična mlijec) dodati hranjivo dijetalnom režimu (šetnji po svježem vazduhu, bogata i raznovrsna ishrana), daju velik i brz terapijski efekat. Najdjelotvornije su tamne sorte meda jer su bogatije mikroelementima i predstavljaju antianemjski faktor. Preporučujemo da se med kombinuje sa polenom i matričnom mlijeci u odnosu 1 kg : 200 g : 10 g . sastojci se dobro izmiješaju i čuvaju na suhom i tamnom mjestu. Uzima se po 1 kašika 3 puta dnevno prije jela ili 3 sata poslije jela. Liječenje traje 1 –2 mjeseca. sljedeći recept : 500 g meda miješa se sa jednim pakovanjem koprivinog sjemena i 3 kašike kakaa. Uzima se po 1 kašičica 3 puta dnevno pola sata poslije jela.

METRITIS

Zapaljenje mišićnog dijela maternice. Bolesnica osjeća bolove i težinu u stomaku. Ova bolest uspješno se lijeći pčelinjim otrovom u vidu uboda, injekcija i masti. Tretmani se vrše nisko u oblasti stomaka.

MIGRENA

Jaka glavobolja koja obuhvata polovicu ili cijelu glavu. Ponekad je prati gađenje, povraćanje, čak i prestanak funkcija pojedinih moždanih centara. To je nervno oboljenje uglavnom nasljedne predispozicije. Lijeći se na sljedeći načine :

za vrijeme napada uzima se kašika meda (od nane, lavande i dr.) rastvorenog u 100 g mlake vode i 30 kapljica 30 % alkoholnog ekstrakta propolisa. Nakon 20 – 30 minuta bolovi prolaze.

u periodu bez napada propisuje se 1 kg meda pomiješanog sa 200 g polena i 10 g matična mlijec, 3 puta dnevno po jedna kašika u čaši vode. Liječenje traje 1 mjesec.

MIKOZA

Tako se zove svako kožno oboljenje izazvano gljivicama. Nekoliko puta dnevno oštećena mjesta se mažu propolisovom mašću ili 30 – 40 % alkoholnim ekstraktom propolisa. Liječenje traje do ozdravljenja.

MIŠIĆNI BOLOVI – MIALGIJE

Bolovi mišića bez objektivnog nalaza uzrokovani prehladom, umorom, traumom ili reumom. Liječi se pčelinjim otrovom u vidu uboda, injekcija i masti u oblasti oštećenih dijelova (izuzev glave), mješavinom jednakih količina meda, brašna i slačicinog brašna na mjestu bolova. Takođe pomažu i termalne aplikacije voska i propolisa u odnosu 8 : 2, zagrijanih u sudu vrućom vodom, a koji se stave na bolno mjesto. Broj tretmana 10 – 15.

MIŠIĆNI UMOR – MIASTEMIJA

Ispoljava se u vidu stalne mišićne slabosti, brzo nastajućeg umora mišića pri aktivnosti. Liječi se dugotrajnim unutrašnjim uzimanjem meda sa polenom u odnosu 8:2. propisuje se po jedna kašika 3 puta dnevno 3 sata poslije jela u toku 1-2 mjeseca.

NEDOSTATAK APETITA – ANOREKSIJA

Stanje koje vodi do slabljenja, nemoći, smanjene radne sposobnosti, lošeg sna, blijede kože i krvnih pokazatelja ispod norme. Matična mlijec je pravi lijek protiv ove bolesti, jer vraća izgubljeni apetit, izaziva stanje bodrosti i priliv energije, svestrano ojačava organizam. Propisuje se u prirodnom obliku po 100 – 200 mg ispod jezika prije jela 2- 3 puta dnevno.

Ova bolest se takođe liječi medom i polenom u odnosu 1:1. Smjesu uzimati po jednu kašiku prije jela u toku 20 – 30 dana.

sljedeći recept : izdrobiti ljske od 10 jaja, zaliti ih sokom od 10 limunai nakon 5 dana procijediti. Umuti se 10 žumanceta, dodaje se 250 g meda, 0,25 l konjaka i sve se izlije u flašu, piće se po pola kafene šoljice prije jela, prije upotrebe dobro promučkati, čuva se dobro zatvoreno na tamnom i hladnom mjestu.

NEURALGIJA

Oboljenje sa napadima bolova duž nekog čulnog ili mješovitog živca, bez vidljive anatomske izmjene. Naročito bolna si izlazna mjesta nerva. Pčelinjik proizvodi, oblici primjene , metode i doziranja su isti kao kod liječenja neuritisa.

NEIRALGIJA MEĐUREBARNA

Liječi se pčelinjim otrovom u periodu 1 –2 mjeseca.

NEURALGIJA TRIGEMINUSA

Oboljenje nastupa obično poslije prehlade ili oboljenja gripa. Liječi se pčelinjim otrovom u periodu 1 –2 mjeseca. Preporučuje se i unutrašnje uzimanje meda i polena po 1 kašiku 3 puta dnevno.

NEURITIS

Oboljenje periferni nerava sa poremećajima u pokretačkom i čulnom provođenju, djelimično upalnog karaktera a djelimično degenerativnog. Za liječenje ove bolesti uspješno se primjenjuju :

pčelinji otrov po opisanim procedurama u toku 20 – 30 dana

propolis u vidu 30 % masti ili 30 5 alkoholnog ratsvora- putem spoljne primjene ili pomoću ultrazvuka. Propolis u kombinaciji sa voskom u odnosu 4 : 6 može se koristiti u obliku lokalnih termalnih aplikacija.

polen primjenjen oralno u već opisanim dozama

med, najbolje u kombinaciji sa slaćicinim brašnom u odnosu 2 :1. primjenjuje se lokalno i ima brz anestetičan regenerativan i protuupalni efekat.

NEURITIS MIŠIĆNOG SPLETA

Predisponirajući faktori su veliki umor, nagli pokreta u oblasti vrata i ramena, prehlada, infekcije, poremećaji u razmjeni materija itd. bolesnik osjeća bolove, smanjenu mišićnu snagu u oblasti ramena i ruke. Liječi se pčelinjim otrovom putem uboda, injekcija ili ultrazvuka u periodu 20 – 30 dana.

NEUJRODERMITIS

Dermatoza kod koje su izmjene na koži rezultat češanja ujsljed nekog prethodnog svraba. Liječi se propolisom u vidu 15 % propolisove masti ili 20 % alkoholnim rastvorom propolisa, mazanjem oštećenog mjesta nekoliko puta dnevno. Obično upalni proces prestaje za 5-8 dana, a svrab još prvog dana. Preporučuje se oralno uzimanje matična mlijec u prirodnom obliku 100-200mg dnevno.

NEUROZA

Oboljenje nervnog sistema bez patološko-anatomskog substrata; u njegovojo bazi nema organskih izmjena. Najčešći uzrok su psihotraume, umni i fizički umor.

Liječenje neuroza zahtijeva odgovarajući režim bez umnog i fizičkog zamora. Pčelinji proizvodi uspješno se koriste u liječenju neuroza:

med ima okrepljujuće dejstvo na nervne ćelije, poboljšava njihovu ishranu i neutralizuje otrove. San postaje miran, vid se poboljšava i stvara se osjećaj radne sposobnosti. Preventivna doza meda je od 0,5-1g po kg težine a ljekovita doza 1-2g po kg težine u 3 obroka. Liječenje traje 1-2 mjeseca.

matična mlijec svojim dejstvom predstavlja odlično ljekovito sredstvo. Dnevna doza prirodnog matična mlijec je 100-200mg, ujutro i u podne prije jela

polen pomaže kod sindroma psihičke potištenosti. Uzima se 3 puta dnevno po 1 kašičica rastvorena u čaši medene vode

Preporučljiva je kombinacija 1kg meda miješanog sa 200g polena i 10g matična mlijec. Uzima se 1 kašika rastvorena u čaši vode, 2-3 puta dnevno, prije jela. Liječenje traje 1-2 mjeseca

NEUROZA SRČANA

Etiologija: negativne emocije, psihička opterećenja. Simptomi: lutanje srca, gušenje, umor, bolovi u oblasti srca, talasi vrućine, nemiran san i gubljenje apetita.

Med i matična mlijec svojim prirodnim svojstvima terapijski djeluju na obnavljanje djelatnosti srca. Propisuje se od 1-2 mjeseca med po 80-100g dnevno u 4 obroka i po 100-200mg matična mlijec

NOĆNO MOKRENJE

Karakteristična je nesposobnost zadržavanja mokraće kod djece preko 3 godine starosti. Ona su razdražljiva, grizu nokte, sisaju prste. Postoje 2 tipa metoda liječenja: preventivna i aktivna terapija. Preventivna počinje od jedne godine starosti navikavanjem djeteta da mokri svaka 3 sata a zatim rjeđe radi regulisanja mokrenja. Daje se doza meda od 1g po kg težine. Aktivna

terapija ima zadatak da kod djeteta stvori sposobnosst da zadržava mokraču. Uveče prije spavanja obavezno se daje kašičica meda. Time on vrši dva dejstva: umiruje nervni sistem i zadržava mokraču. Ujutro i u podne daje se djetetu prije jela 1 kapljica matična mlijec u usta. Poslije regulisanja mokrenja, prekida se uzimanje meda. Prikladne sorte meda su bagremov, livadski, poljski, od nane idr.

OBOLJENJE ZGLOBOVA – ARTROZNA BOLEST

Pojavljuje se kao rezultat degenerativnih procesa na hrskavicama i kostima zglobova. Na nju utiču traume, nasljedni faktori, injekcije i endokrini poremećaji.

pčelinji otrov se primjenjuje po opisanim metodama

matična mlijec 3 puta dnevno prije jela u toku 20-30 dana

vosak i propolis kombinovani u odnosu 8:2 u vidu 20% vazelinsko-propolisove masti ili pomoću ultrazvuka

obloge na zglobovima od 2 dijela meda, 1 dio aloje i 3 dijela votke.

OBOLJENJE JETRE – HEPATITIS

Akutna i hronična oboljenja jtere su hepatitis, holecistopatija, ciroze i dr. propisuje se ujutro 50g meda sa 100-200mg matična mlijec, u podne 1 kašiku meda sa 1 kašikom polena, ubveće med sa matična mlijec i polenom. Karotin u medu pretvara se u vitamin A. Med sa svojim sastojcima pomaže procese razmjene u jetri. Sastojak meda – holin smanjuje sadržaj masti u jetri. Kod oboljenja jtre i žući preporučuje se med rastvoren u alkalno-sulfatnoj vodi 3 puta dnevno. Prikladni su livadski, poljski i voćni med.

OŽILJCI OD RANA

Novonastalo vezivno tkivo pretvara se u tvrdo tkivo u vidu ožiljka. Njemu fale elastičnost i pokretljivost, što često dovodi do defekata. Pčelinji otrov se primjenjuje u liječenju ožiljaka nastalih poslije rana ili operacija, koriste se pčelinji ubodi, elektroforeza ili ultrazvuk.

OZLJEDE

Uzroci su mehanički. Oštećuje se površina kože do kapilarnog sloja s krvarenjem apostoji i opasnost od infekcije.

Oštećeno mjesto se maže medom i krvarenje brzo prestaje. Pri dubljim ranama povrh meda se stavi gaza i fiksira flasterom, ne mijenja se. Za 1-2 dan rana zarasta.

30% alkoholni ekstrakt propolisa vatom umočenom u ekstrakt maže se oštećeno mjesto. Krvarenje i bol prestaju a do slijedećeg dana rana obično epitelizira i zarasta.

OJED

Zapaljenje kože izazvano trljanjem dodirnih površina kože. Oboljelo mjesto se maže više puta dnevno čistim medom. Dobro djeluje i puderisanje oštećenog mjesta 5% puderom od propolisa

OPADANJE KOSE

Djelimično ili potpuno opadanje kose. Lijeći se na slijedeći način:

Med. U toku 20-30 dana svakodnevno nakon ispiranja topлом vodom i sapunom, oboljelo mjesto se maže medom. najbolje je da se tretman obavi naveče a da se ujutro opere liječeno mjesto. Istovremeno se uzima oralno 100-200g meda u 3 obroka

propolis. 30% propolisova mast na vezelinskoj osnovi ili 30% alkoholni ekstrakt propolisa. Nakon ispiranja mjesta sa opalom kosom 1-2 puta se vrše energična utrljavanja jednog od navedenih preparata. Prve dlake izrastaju 2-3 nedjelje a liječenje traje do 3 mjeseca. Pozitivno djeluje u 82% slučajeva

OPEKOTINE

U zavisnosti od oštećenja, imamo opekotine 1, 2,3 i 4 stepena. Poslije obrađivanja (čišćenja) rane, pravi se sterilni zavoj od gaze, dobro umočen u med. Mijenja se svaki ili svaki drugi dan. Svojim svojstvima, med pomaže epitelizaciju rana i ozdravljenje. Liječenje takođe može da se vrši i propolisom na slijedeći način: biljno ulje (od breskve, kajsije, suncokreta) se kuha do ključanja a zatim se u njega dodaje očišćen i usitnjen u prah propolis, dobro se umuti i ponovo se kuha do ključanja. Cijedi se kroz nekoliko slojeva gaze a zatim, nakon pažljivog uklanjanja nekrotične matična mlječase, na gazi stavlja na ranu. Bolovi brzo prolaze, mikroflora se uništava, poboljšava se cirkulacija krvi i limfe. Počinju regenerativni procesi i rana brzo zarasta. Skidanje zavoja je bezbolno i ne povređuje ranu. Zavoj se mijenja svakodnevno ili svaki drugi dan (zavisno od stepena opekotine) do potpunog ozdravljenja.

OPŠTA SLABOST – ASTENIJA

Slabost, nemoć, bljedilo. Uzroci su nasljedni faktor, umor, psihičke traume, slaba ishrana itd. preporučuje se uzimanje meda u dozi 100-120g dnevno u 3-4 obroka u toku 1-2 mjeseca

kombinacija 1kg meda, 200g polena i 5g matična mlječ. Za kratko vrijeme otklanja umni i fizički umor. Ima antidepresivno dejstvo. Liječenje traje 1-2 mjeseca.

OSTEOARTRITIS DEFORMIŠUĆI

Bolest koja oštećuje velike zglobove, prvenstveno koljena i karlične zglobove. Simptomi su: slabti bolovi, nespretni pokreti, pucketanje i trljanje u zglobovima pri pokretima.

Pčelinji otrov se primjenjuje u vidu uboda, injekcija, masti i unošenja otrova ultrazvukom i elektroforezom u oblasti oštećenih zglobova

propolisova ljekovita mast ili ekstrakt uvodi se u oblast oštećenih zglobova ultrazvukom ili elektroforezom. Na oboljelim mjestima se mogu stavljati i voštano-propolisove obloge

matična mlijec se uzima u prirodnom obliku 100-200mg 3 puta dnevno prije jela. Posebno je korisno njegovo uzimanje kod žena

Med najbolje djeluje u kominaciji sa brašnom od slačice u odnosu 2:1. smješom se maže oboljeli zglob, prekriva se gazom i fiksira.

Liječenje pčelinjim proizvodima traje 20-30 dana, u slučaju potrebe može se ponoviti.

OTALGIJA – BOLOVI U UŠIMA

Bolovi u ušima koji nisu vezani za oboljenje srednjeg i spoljnog uha.

Miješaju se jednake količine 20% alkoholnog ekstrakta propolisa i suncokretovog ili ribljeg ulja. Nakon energičnog mučkanja smjese, u oboljelo uho se stavlja 3-4 kapljice, nekoliko puta dnevno. Može se u spoljni ušni kanal staviti i sterilna gaza umočena u smjesu. Liječenje traje do prestanka bolova (5-10 dana) a može se i nastaviti ili ponoviti.

OTVARANJE RANA NA KOŽI – DEKUBITIS

Otvaranje rana na koži od dugog ležanja u istom položaju. Važnije su profilaktičke mjere – pokretanje i masiranje. Propolis u vidu aerosola , ljekovite masti ili 20% alkoholnog ekstrakta propolisa se aplicira na oštećeno mjesto.

OTITIS SREDNJEG UHA

Oboljenje prehladnog karaktera sa infekcijsko-upalnim pojavama: bolovima, gnojem, glavoboljom, smanjenim sluhom. Nakon čišćenja uha od gnoja, u slušni kanal sve do opne se uvodi gaza umočena u 20% alkoholnog ekstrakta propolisa. Postupak se sprovodi jedanput dnevno a liječenje traje 10-15 dana. Uspješno djeluje u 95% slučajeva.

OTOMIKOZA- GLJIVIČNO ZAPALJENJE SLUŠNOG KANALA

Bolest prouzrokovana gljivicama. Oštećeno uho se maže alkoholnim ekstraktom propolisa. Najbolje je staviti u ušni kanalgazu umočenu u ekstrakt i zamijeniti je sljedećeg dana. Liječenje traje 4-5 dana a rezultat je veoma dobar. Svrab prestaje već prvi dan.

OŠTEĆENJE MIOKARDA

Oštećenje miokarda može da izazove svaka infekcija, intoksikacije, uremija, opekomine, lijekovi itd. oštećuju se mišićna vlakna i pojavljuju raznovrsni poremećaji u ritmu. Simptomi su opšta slabost, gušenje, osjećaj tjeskobe, hladni udovi, ubrzani puls, nizak tlak.

Med, najbolje vrsta sa većim sadržajem fruktoze. Dnevno uzimati po 1-2g po kg težine u 3-4 obroka, 1-2 sata prije jela ili 2 sata poslije jela. Medu se može dodati i 1% matične mlijecu ili 10% polena

Matična mlijec. Uzima se po 100-200mg prirodnog matična mlijec ujutro i u podne prije jela.

Polen. Uzima se po kašičica 3 puta dnevno prije jela, najbolje kabinovano sa medom

Propolis. Uzima se po 20-30 kapljica 30% alkoholnog ekstrakta propolisa 3 puta dnevno u čaši mlijeka ili mlake vode, prije jela. Povoljno djeluje na razmjenu holesterola i lipida.

Pčelinji otrov u vidu uboda ili injekcija proširuje krvne sudove, uklanja bol i poboljšava kolateralnu cirkulaciju krvi, smanjuje holestelor i trigliceride u krvi.

PIODERMIJA

Površinski ili dublji upalni proces, obično izazvan piogenim kokama.

Liječenje može da se sproveđe propolisom: oštećena koža se nekoliko puta dnevno maže 20% alkoholnim ekstraktom propolisa ili 15% propolisovom mašcu. Ako je oštećeno polje veće i dublje, mogu se praviti zavoji sa propolisovom mašcu, ekstraktom ili medom. Slijedećeg dana zavoj se mijenja. Može se koristiti i smjesa 50g meda sa 5g propolisa u prahu. Ovom ljekovitom mašcu se pravi zavoj na oštećenom mjestu. Tretiranje žarišta traje do ozdravljenja.

POVIŠEN KRVNI PRITISAK – HIPERTONIA

Uzroci oboljenja su različiti: neurogeni, psihogeni, arterosklerotični, sekundarni itd. Svi pčelinji proizvodi imaju hipotončno dejstvo, mogu se uzimati pojedinačno ili kombinovano. Preporučuje se da se 1kg meda pomiješa sa 5-10g matična mlijec, 200g polena i 50g propolisa u prahu. Uzima se po 1 kašika 3 puta dnevno prije jela u čaši vode.

Pčelinji otrov se primjenjuje u vidu pčelinjih uboda ili potkožnih injekcija.

Propolis se uzima kao 10% propolisova voda ili 30% alkoholni ekstrakt propolisa 3 puta dnevno po 30 kapljica prije jela u čaši vode ili mlijeka. Liječenje tarje 1-2 mjeseca. Dobro hipotončko dejstvo ima mješavina soka od šargarepe, hrena, čaše meda i soka od jednog limuna. Pije se po kašičica 3 puta dnevno prije jela.

POLIARTRITIS

Oboljenje počinje sa bolovima, oteklinama i crvenilom više zglobova, sa temperaturom simptomi prethode ili su praćeni najčešće katarom gornjih disajnih puteva, a uzročnici su strptokoke. Međunarodna zajednica za borbu protiv reumatizma prihvatile je pčelinji otrov kao sigurno antireumatično sredstvo. Primjenjuje se u vidu pčelinjih uboda, injekcija, ultrazvuka, elektroforeze ili ljekovitih masti za spoljno utrljavanje. Liječenje traje dugo, jedan tretman obuhvata 150-200 ubodapčela.

POLNA NEMOĆ – IMPOTENCIJA

Radi se o polnoj nemoći kao rezultatu nervnopsihičkih faktora, velikog umora, starosti i endokrinih poremećaja. Liječi se na slijedeći način:

Med uzimati u kombinaciji sa polenom u odnosu 5:1 – 3 puta dnevno se piye po kašika rastvorena u mlakoj vodi, prije jela, liječenje traje 1-2 mjeseca. Druga varijanta: med kombinovati sa matičnom mlječi u vidu 1% ili 2% rastvora. Uzimati po kašiku 3 dnevno prije jela. Najbolja i najefektnija kombinacija je med, matična mlječ i polen u pomenutim procentima. Uzima se po kašika 3-4 puta dnevno prije jela.

polen. Po 1 kašiku 3 puta dnevno prije jela u toku 1-2 mjeseca. Kao samostalno sredstvo, polen se propisuje samo ako pacijent ima alergiju prema medu ili matičnoj mlječi.

matična mlječ. Propisuje se 100-200mg dnevno u 3 obroka, u toku 1-2 mjeseca, prije jela, pod jezikom.

U slučaju potrebe, nakon pauze od 15 dana, liječenje ponoviti.

PROLJEV – DIJAREJA

Protiv proliva propisuje se 1 kašiku polena i 1 kašiku meda rastvoriti u čaši hladne vode. Pije se jedna doza ujutro, jedna u podne i jedna uveče. Djeca uzimaju pola ili četvrtinu doze za odrasle.

PROŠIRENJE BRONHIJA

Proširenje bronhija u određenim dijelovima pluća, razvija se uslijed upalnih procesa. Bolesnici stalno kašlju, ujutro luče velike količine ispljuvaka, često sa krvavim tragovima a često imaju i visoku temperaturu.

Liječenje medom uključuje unutrašnje uzimanje meda 100-200g dnevno u 6 obroka sa zadržavanjem u ustima, aerosolne inhalacije meda i oralno po 1 kašiku 3 puta dnevno prije jela 10% vodenog ekstrakta propolisa. Liječenje traje 20-40 dana.

PROŠIRENE VENE

Nm preporučuje obloge vena na mjestu proširenja od tankog sloja meda i sitno sjeckanog peršuna, nekoliko puta dnevno. Uzimaju se jednakе količine meda i peršuna, peršun se sitno sjecka a zatim tuče u avanu i energično miješa sa medom. smjša se maže u tankom sloju, bolesnik je u ležećem položaju. Liječenje traje 15-20 dana.

PURITIS – SVRAB

Svrab je sindrom nogih kožnih oboljenja, a može da se javi bez patološkog uzroka. Kod svih oblika svraba od velikog je značaja je lokalna primjena propolisa. Koristi se kao 20% alkoholni ekstrakt propolisa i 15% propolisova mast. Polje svraba se maže nekoliko puta jednim od preparata a liječenje traje do prestanka svraba.

PURITIS ANI

Svrab u čmarnoj oblasti, najčešće izazvan hemoroidima, crijevnim parazitima idr. Najbole sredstvo je propolisova mast na bazi neslane masti ili kravljeg butera, soravljenog u posudi koja se stavi u sud sa vrućom vodom. Može se koristiti i 30% alkoholni ekstrakt propolisa u mješavini sa jednakom količinom ribljeg, suncokretovog ili kukuruznog ulja. Gaza umočena u ekstrakt se stavlja u oblast svraba 1-2 puta dnevno. Svrab prolazi za 10-20 minuta. Kada se radi o hemoroidnom svrabu, dobro je u oblast hemoroida staviti mješavinu ušećerenog meda i 30% propolisove masti u odnosu 1:1. liječenje traje do prestanka puritisa.

PURITIS VULVE

Svrab lokalizovan na polnim organima žene. Preporučuje se tretiranje mesta svraba sa 15% propolisovom mašću ili 20% alkoholnim ekstraktom propolisa, 1-2 puta dnevno, do izlječenja. Svrab prolazi za 10-20 minuta.

PSORIJAZA

Kožno oboljenje u mjestima savijanja udova, u ograničenim poljima kože u obliku ružičastih pjega i papula pokrivenih ljuspama poput peruti. Preporučuje se liječenje oralnim uzimanjem propolisa 3 puta dnevno u čaši vode ili mlijeka. Liječenje traje 2-3 mjeseca. Kod bolesnika sa zastarjelošću bolesti do 1 godine, stepen izlječenja je 64-71%, zastarjelost do 5 godina – 46%. Efekat liječenja će biti veći ako se ono kombinuje sa spoljnim tretiranjem oštećenih mesta 20% alkoholnim ekstraktom propolisa ili 15-30% propolisovom mašću.

RANE

Svako oštećenje cjeline pokrivnog tkiva(kože ili sluzokože) je rana. Ona može biti vezana za oštećenje potkožnog tkiva, mišića, sudova i živaca. Karakteristični su bol, krvarenje, lučenje limfe i sklonost inficiranju. Pčelinji proizvodi (med, propolis, vosak i pčelinji otrov) su dobro

ljekovito sredstvo za razne brste rana. Njihova lokalna aplikacija dovodi do brzog zaustavljanja krvarenja i ukidanja bola; oni djeluju protivupalno i antibakterijski, vode do brzih regenerativnih procesa, epitelizacije rane i ozdravljenja.

RANE ATROFIČNE

Atrofične rane su hroničnog karaktera i teško se liječe. Kao uspješno sredstvo, pokazala se kombinacija od 80g meda i 20g ribljeg ulja u vidu zavoja. Mnogi autori preporučuju liječenje ovih rana 15% propolisovom mašću u vidu sterilnog zavoja a dobri rezultati se postižu i pčelinjim ubodima.

RANE KONTUZNE I ISKIDANO-KONTUZNE

Ne postoji bitna razlika između ovih vrsta rana. Karakteristično je oštećenje cjeline kože od udarca tupim i tvrdim predmetom. Uspješno se liječe kombinacijom 80g meda i 20g ribljeg ulja u vidu zavoja. Med uništav mikroorganizme a riblje ulje potpomaže granulaciju.

RANE OD POSJEKOTINA

Slabe površinske posjekotine oštrim predmetom. Rubovi posjekotina su glatki i obilno krvare. gaza sa medom stavlja se na posjekotinu, odmah zaustavlja krvarenje i sprječava bilo kakvu infekciju. Do sljedećeg dana rana je već epitelizirala, isječene površine su se slijepile i obično nije potrebno mijenjati zavoj.

tampon umočen u 30% alkoholni ekstrakt propolisa i stavljen na posjekotinu 3-4 minuta odmah zaustavlja krvarenje i bol i ne dozvoljava infekciju. Zbog brzog isparavanja alkohola, na rani se formira zaštitna korica, slepljuju se oba kraja rane i do sljedećeg dana počinje epitelizacija rane. Kod dubljih posjekotina bolje je držati rastvor propolisa 1-2 dana.

RANE UBODNE

Zavoj sa medom ili 30% alkoholnim ekstraktom propolisa zaustavlja krvarenje i bol i ne dozvoljava infekciju. Za 3-4 dana nastaje granulacija, epitelizacija i potpuno ozdravljenje.

RANE OD UBODA PČELA

Radi se o ubodima kod ljudi koji su supersjetljivi prema pčelinjem otrovu. Smrtonosna doza za normalnog čovjeka iznosi oko 500 uboda pčela istovremeno, dok za supersjetljive samo jedan ubod može biti koban. Prvi zadatak je da se odmah izvadi žaoka. Ne smije se vaditi rukom jer se tako pospješuje lučenje otrova. Žaoka se vadi igлом ili pincetom a ubodeno mjesto se maže čistim alkoholom, uzimaju se antialergijski lijekovi, vitamin C i hitno traži pomoć ljekara.

RANICE NA GRLIĆU MATERICE

Ranica lokalizovana oko spoljnog otvora grlića materice. Liječe se lokalnim aplikacijama medom, 15% propolisovom mašču ili 5% vodeno-alkoholnim ekstraktom propolisa. Tamponi se stave visoko do ranice, gdje ostaju najmanje 5-6 sati. Uspješnost liječenja preko 80%.

REUMATIZAM

Reumatizam je infektivno alergijsko oboljenje s infekcijsko-neurogenom patogenom. Uspješno se liječi pčelinjim otrovom po zadatoj šemi.

SINUSITISI

Oboljenja okonosnih šupljina izazvana virusima i bakterijama. Simptomi: gnojni sekret iz nosa i zapušen nos, glavobolja, umor, malaksalost, nedostatak apetita.

U liječenju se primjenjuju med i propolis. Med je u obliku 20-30% rastvora za aerosolne ili ultrazvučne inhalacije, kao i elektroforezu nosnih šupljina. Dnevno se prave po 2 aerosolne inhalacije a uveče se primjenjuje lokalna aplikacija meda u nozdrve. Liječenje traje 15-20 dana. Istovremeno se oralno uzima med sisanjem i kašičicom na svaka 3 sata. Ljekoviti efekat se postiže u preko 95% slučajeva. Dobar terapijski efekat daje i liječenje propolisom kroz inhalacije a uveče pred spavanje se stave tamponi umočeni u 5-10% vodeno-alkoholnog ekstrakta propolisa pomiješanog sa ribljim uljem u odnosu 1:3. tretmani traju 15-20 dana.

SITNE GLISTE

Sitne gliste žive u debelom crijevu čovjeka i češće se nalaze kod djece. Bolesnici spavaju nespokojno, osjećaju svrab oko čmara, nedostatak apetita, nervozu.

Liječenje se vrši medom, najbolje ušećerenim i traje 5-10 dana. Svakodnevno, uveče prije spavanja oblast oko čmara nakon dobrog ispiranja namaže se medom i pokrije gazom. Istovremeno se oralno uzima po 2g meda na 1 kg težine podijeljeno u 4 obroka u vidu hipertoničnog rastvora. Već prvog dana svrab prestaje, san se normalizuje. Med uništava i jaja položena u čmarnoj oblasti.

SKLEROZA GENERALIZOVANA

Pčelinji proizvodi su najbolje profilaktičko sredstvo za dug život i borbu protiv arteroskleroze.

Primjenjuju se na slijedeći način:

Med. Dnevno 60-80g u 3 obroka ili do 1g po kg tjelesne težine
Matična mlječ (prirodni). Po 50-100mg dnevno ujutro i u podne prije jela
Polen. 1 kašičica rastvorena u čaši vode ili mluijeka, 3 puta dnevno, prije jela

Propolis. 20% alkoholni ekstrakt propolisa po 20 kapljica 3 puta dnevno prije jela u čaši vode ili mlijeka

Ubodi pčela, 1-5 dnevno

Navedene pčelinje proizvode ne treba uzimati istovremeno, mogu se primjenjivati naizmjenično. Mogu se kombinovati med i matična mlječ, med i polen.

SLABLJENJE VIDA

Brzo zamaranje oka prilikom dugotrajnog gledanja na bliskom odstojanju. Dobri rezultati se postižu liječenjem matičnom mlječi, doza od 100mg dnevno, 2-3 nedjelje

SNIŽEN KRVNI PRITISAK – HIPOTONIJA

Snižen krvni pritisak prouzrokovani nervno-vegetativnim poremećajima, anemijom, kahezijom itd. Bolesnik osjeća slabost, brzo zamaranje, zamračenje, glavobolju, nedostatak apetita itd.

Matična mlječ utiče ujedni i na simpatikus i parasimpatikus i time reguliše krvni pritisak. Kad je hipotonija praćena anemijom i kahezijom, liječenji se kombinacijom matičnog mlječa, meda i polena. Tretmani traju 4-5 nedjelja. Dnevna doza matičnog mlječa je 100-200mg, 3 puta dnevno prije jela.

SOR

Gljivično oboljenje na sluzokoži ustadesni i jezika, najčešće kod novorođenčadi.

Oko 100g ušećerenog meda miješa se sa 10g propolisa. Svakih 1-2 sata cucla se namaže ovom smješom i daje bebi da sisa. Kod odraslih se uzima po kašičica na svaka 3 sata i sisa se.

SPONDILOARTROZA

Izazvana je degenerativnim oštećenjima kičme, nastalim zbog poremećaja kalcijum-fosforne razmjene. Dobar terapijski efekat daje pčelinji otrov u vidu direktnih uboda, injekcija, ultrazvuka ili utrljavanja. Tretmani se sprovode duž kičme u oblasti bolnih tačaka. Liječenje traje 20-30 dana a može se produžiti ili ponoviti. Dobro rezultati u preko 60% slučajeva.

STOMATITIS AFTOZNI

Najčešće boluju djeca, odrasli pri nicanju umnjaka, a takođe i trudnice. Na sluzokoži usta pojavljuju se mali mjehurići, punoi tečnosti sličnoj mljeku, koji se kasnije pretvaraju u rane. Javljuju se bolovi kod gutanja, povećano lučenje pljuvačke, neprijatan zadah, uvećane regionalne žljezde.

- tretiranje 30% alkoholnim ekstraktom propolisa 1-2 puta dnevno
- ispiranje usta 5% vodeno-alkoholnim ekstraktom propolisa, svaka 2-3 sata
- žvakanje malih kuglica propolisa, 3-4 puta dnevno.

Liječenje traje do ozdravljenja, obično 2-5 dana.

Kod stomatitisa epidemiskog (dobija se od zaraženog mlijeka i mlječnih prozvoda) najbolje je žvakati i sisati na svaka 2-3 sata kašičicu meda, višekratno ispirati usta 5% vodeno-alkoholnim ekstraktom propolisa, sa zadržavanjem u ustima. Liječenje traje 2-4 dana.

SKLEROZA GENERALIZOVANA

Pčelinji proizvodi su najbolje profilaktičko sredstvo za dug život i borbu protiv arteroskleroze.

Primjenjuju se na slijedeći način:

- Med. Dnevno 60-80g u 3 obroka ili do 1g po kg tjelesne težine
- Matična mlijec (prirodni). Po 50-100mg dnevno ujutro i u podne prije jela
- Polen. 1 kaščica rastvorena u čaši vode ili mlijeka, 3 puta dnevno, prije jela
- Propolis. 20% alkoholni ekstrakt propolisa po 20 kapljica 3 puta dnevno prije jela u čaši vode ili mlijeka
- Ubodi pčela, 1-5 dnevno

Navedene pčelinje proizvode ne treba uzimati istovremeno, mogu se primjenjivati naizmjenično. Mogu se kombinovati med i matična mlijec, med i polen.

SLABLJENJE VIDA

Brzo zamaranje oka prilikom dugotrajnog gledanja na bliskom odstojanju. Dobri rezultati se postižu liječenjem matičnom mlijeci, doza od 100mg dnevno, 2-3 nedjelje

SNIŽEN KRVNI PRITISAK - HIPOTONIJA

Snižen krvni pritisak prouzrokovani nervno-vegetativnim poremećajima, anemijom, kahezijom itd. Bolesnik osjeća slabost, brzo zamaranje, zamračenje, glavobolju, nedostatak apetita isl.

Matična mlijec utiče ujedni i na simpatikus i parasympatikus i time reguliše krvni pritisak. Kad je hipotonija praćena anemijom i kahezijom, liječenje se kombinacijom matičnog mlijeca, meda i polena. Tretmani traju 4-5 nedjelja. Dnevna doza matičnog mlijeca je 100-200mg, 3 puta dnevno prije jela.

SPONDILOARTROZA

Izazvana je degenerativnim oštećenjima kičme, nastalim zbog poremećaja kalcijum-fosforne razmjene. Dobar terapijski efekat daje pčelinji otrov u vidu direktnih uboda, injekcija,

ultrazvuka ili utrljavanja. Tretmani se sprovode duž kičme u oblasti bolnih tačaka. Liječenje traje 20-30 dana a može se produžiti ili ponoviti. Dobro rezultati u preko 60% slučajeva.

STOMATITIS AFTOZNI

Najčešće boluju djeca, odrasli pri nicanju umnjaka, a takođe i trudnice. Na sluzokoži usta pojavljuju se mali mjejhurići, puno tečnosti sličnoj mljeku, koji se kasnije pretvaraju u rane. Javljuju se bolovi kod gutanja , povećano lučenje pljuvačke, neprijatan zadah, uvećane regionalne žljezde. Liječenje:

- tretiranje 30% alkoholnim ekstraktom propolisa 1-2 puta dnevno
- ispiranje usta 5% vodeno-alkoholnim ekstraktom propolisa, svaka 2-3 sata
- žvakanje malih kuglica propolisa, 3-4 puta dnevno.

Liječenje traje do ozdravljenja, obično 2-5 dana.

Kod stomatitisa epidemijskog (dobija se od zaraženog mlijeka i mlječnih proizvoda) najbolje je žvakati i sisati na svaka 2-3 sata kašičicu meda, višekratno ispirati usta 5% vodeno-alkoholnim ekstraktom propolisa, sa zadržavanjem u ustima. Liječenje traje 2-4 dana.

Liječenje stomatitisa kataralno-gnojavog (zapaljenje sluzokože usne duplje) vrši se takođe ispiranjem 5% vodeno-alkoholnim ekstraktom propolisa. Liječenje traje do ozdravljenja, obično 2-4 dana uz oralno uzimanje 100-120g meda, po kašičica na svaka 3 sata, sa zadržavanjem u ustima.

TRAHEITIS, TRAHEOBRONHITIS

Oboljenje je obično infektivno-upalnog karaktera. Na početku je upalni proces lokalizovan u traheji, nakon čega obuhvata bronhije. Bolesnici se žale na grudne kosti i kašalj, prvo suhi a zatim sa ispljuvcima. Za liječenje se koriste med i propolis. Med se uzima aerosolnim ili parnim inhalacijama, kombinovano sa oralnim uzimanjem i zadržavanjem u ustima. Uzima se po kašičica na svaka 3 sata a inhalira 2 puta dnevno. Aerosolne inhalacije se takođe mogu praviti sa 15-20% vodenim rastvorom ili 5% vodeno-alkoholnom emulzijom propolisa. I sa propolisovim inhalacijama koristi se unutrašnje uzimanje meda sa zadržavanjem u ustima. Istovremeno se uzima po 20-30 kapljica 30% alkoholnog ekstrakta propolisa u čaši vode ili mlijeka 3 puta dnevno. Liječenje traje 7-20 dana i može se po potrebi ponoviti.

TRIHOFITIJA

Bolest kože ili dlaka i noktiju gljivičnog porijekla. Karakterističan je uporan svrab koji vodi do povređivanja tkiva. Liječi se 50% propolisovom mašču spravljenom na bazi biljnog ulja pri slabom vrenju ili alkoholni ekstrakt propolisa. Mehlem se maže u debelom sloju po bolesnom dijelu tijela i prekriva voštanim papirom. Za 4-5 dana bolovi isvrab nestaju. Liječenje traje 7-30 dana, efekat potpun.

TRIHAMONASNI URETRITIS

Upalni proces lokakizovan u mokračnom kanalu i u bešici. Simptomi su pojačan sekret, svrab i bol, često mokrenje. Zaraza se prenosi polnim putem.

Bešika se ispira 30%-nim rastvorom meda i istovremeno se uzima oralno 100-120g dnevno. Liječenje traje 3-5 dana.

TRIHAMONAS VAGINALIS

Zapaljenje vagine izazvano mikroorganizmima – trihamonasom. Veoma često oboljenje, karakterišu ga lučenje žuto-zelenkastog pjenušavog sekreta neprijatnog mirisa, osjećaj pečenja i svrab.

Liječi se lokalnim aplikacijama meda ili elektroforezom meda u vaginalnoj oblasti. Prikladne sorte meda su: livadski, poljski, planinski itd. Bolje je koristiti ušećeren med. Na isti način se može koristiti i propolis.

TROVANJE

Narodna medicina preporučuje kao lijek protiv trovanja med, samostalno ili u kombinaciji sa mljekom kod trovanja hranom, gljivama, alkoholom i metalima, te kod uboda insekata. Protivotrovno dejstvo meda je potvrđeno, ali se ono koristi samo kao prva pomoć do odlaska ljekara. Kao jednokratna doza, obično se daje 150-200g meda.

TUBERKULOZA KOŽE – VUKOJEDINA

Uzrokuju je humane i životinjske tuberkulozne bakterije, na koži se pojavljuju čvorovi ružičasto-mrke do žutocrvene boje, prvenstveno na koži lica i cijelog tijela.

Za liječenje se koristi 30% propolis-salicilna mast koja se spravlja na bazi kajmaka od mljeka i propolisovog alkoholnog ekstrakta. Mast se maže u debelom sloju i prekriva voštanim papirom ili flasterom. Kod varikoznih oboljenja, mast se mijenja svakih 2-3 dana a kod infiltrativnih svakodnevno. Poslije uklanjanja izraštaja liječenje se nastavlja istom mašću ali bez salicilne kiseline, ili gustim ekstraktom alkoholnog rastvora propolisa. Maže se do potpunog uklanjanja izraštaja, prestanka gnojnih izlučina i konačnog uklanjanja infiltrata. Liječenje traje 1-2 mjeseca.

TUBERKULOZA PLUĆA

Tuberkuloza je teška bolest i može da se lijeći pčelinjim proizvodima jedino u slučaju nepodnošljivosti prema protituberkuloznim preparatima.

TUMOR ZLOĆUDNI

Činjenica je da pčelari vrlo rijetko boluju od zloćudnih tumora. Još uvijek se ne zna tačno zbog čega, ali se pretpostavlja da naročito blagotvorno dejstvo u prevenciji tumora predstavljaju pčelinji otrov i matična mlijec.

UPALA DESNI GNOJNA

Upalni proces po rubu desni sa gnojenjem koje može dovesti do klimanja zuba. Uzroci su loša higijena zuba i bakterijske infekcije. Lijeći se tretiranjem desni 30%-nim alkoholnim ekstraktom propolisane koliko puta dnevno ili uzimanje m 6 puta dnevno, svaka 3 sata, sa zadržavanjem u ustima slijedeću smješu: 500g meda, 100g polenai 25g propolisa u prahu. Smješa se dobro promiješa i čuva u dobro zatvorenom sudu. Liječenje traje do ozdravljenja.

UPALA OKA

Upalni proces, oštećeje iris i cilijarno tijelo. Simtomi: bol, crvenilo, otečenost, oštećen vid.

Uspješno se lijeći primjenom pčelinjeg otrova (ubodima ili injekcijama) u oblasti očne jabučice, a najbolje na leđima između plećki.

UPALA OĆNIH KAPAKA

Zapaljenje rubova očnih kapaka, najčešći uzrok su streptokoke.

- Lijeći se svježim medom, 2-3 kapljice u oči 3-4 puta dnevno, 2-3 dana.

UPALA SINUSA

Simptomi su glavobolja u osnovi nosa i potiljka, gnojav sekret, smrad iz nosa itd.

Prave se aerosolne inhalacije 30%-nog rastvora meda, 2 puta dnevno, uz lokalnu aplikaciju meda u nozdrve. Pozitivan rezultat u 95% slučajeva.

UPALA OZUBLJA – PARADENTOZA

Upalni proces koji zahvata tkiva oko zuba, dovodi do ogoljenja i klimanja zuba, formiranja zubnog kamenca, upalnih kesica na desnima i ispadanja zuba.

Lijeći se propolisom, tamponima umočenim u 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa i postavljenim na žarište zapaljenja, što dovodi do zaustavljanja i uklanjanja upalnog procesa. Primjenjen u vidu propolisove vode i vodeno-alkoholnog ekstrakta propolisa neposredno prije zubarske intervencije, propolis obezbjeđuje bezbolan tretman.

HEMOROIDI

Varikozno proširenje venja u donjim dijelovima debelog crijeva, unutar ili van čmara. Obično se pojavljuje kao rezultat neaktivnosti i zatvora, praćeno je bolom, svrabom i krvarenjem.

Preporučuje se oralno uzimanje meda; vodenog rastvora 10-12% propolisa, po 1 kašika 3 puta dnevno prije jela; 30%-nog alkoholnog ekstrakta propolisa, po 30-40 kapljica 3 puta dnevno u čaši vode. Lokalno se aplicira propolisova mast na gazi 1-2 puta dnevno. Djeluje dobro na zidove vena i propolisova mast na bazi biljnog ili ricinusovog ulja.

HERPES

Virusno oboljenje, predisponirajući faktor prehlada.

Nekoliko puta dnevno se stavlju obloge od 20% vodene emulzije propolisa ili mazanje 30% alkoholnim ekstraktom propolisa ili 15% propolisovom mašcu. Obično poslije tretmana svrab i bolovi prolaze. Liječenje traje 5-7 dana, do ozdravljenja.

HIPERTROFIJA PROSTATE

Oboljenje vezano za hormonske poremećaje u radu prostate, zbog čega nastaje hipertrofija (uvećanje) prostate, obično kod muškaraca preko 45 godina starosti. Bolest vodi do zadržavanja mokraće, čestog uriniranja, slabog i isprekidanog mlaza, bolova idr. Predstavlja veoma čestu bolest (bolest savremenog društva) a starosna granica oboljelih se srušta.

Polen se uzima u kombinaciji sa medom u odnosu 1:1, po kašiku 3 puta dnevno, 1 sat prije jela. Polen i med se rastvaraju u čaši vode 24 sata prije upotrebe. Mokrenje se brzo normalizuje, prestaju noćna ustajanja, poboljšava se apetit, raspoloženje, san i polna aktivnost.

HRONIČNO OBOLJENJE NOSA

Počinje kao sluzno-gnojna kihavica, sekrecija se postepeno smanjuje, suši i formira suhe korice žućkastomrke boje i jako neprijatnog mirisa, čulo mirisa polako nestaje a bolesnici osjećaju suhoću i bol u nosu, otežano disanje i glavobolju.

Liječi se aerosolnim inhalacijama 20% meda 1-2 inhalacije dnevno (može i ultrazvučno) ili lokalnim aplikacijama smješe od 100g ušećerenog meda, 2 g matična mlječ, 10g propolisa u prahu, 5g sumpornog praška. Nakon energičnog miješanja, smjesa se stavi u bakelitnu kutiju. U toku 5 dana se prave po 2 aplikacije u nozdrve, u ležećem položaju a nakon toga 10-15 dana po jedna aplikacija dnevno (najbolje uveče). Terapija daje dobar terapijski efekat.

CIROZA JETRE

U etiologiji ciroze ulogu igraju razni faktori: oboljenje jetre i žučnih kanala uslijed hepatitis, mehaničke žutice, alkoholizma idr. Bolesnici osjećaju opštu malaksalost, nedostatak apetita, mršavljenje, koža je ikterična.

Preporučuje se dugotrajno uzimanje meda, 80-120 g dnevno u nekoliko obroka; polena 15-20g dnevno; propolisa po 1 kašika 10% vodenog rastvora 3 puta dnevno; matične mlijeci 100-200mg dnevno. Pčelinji proizvodi imaju detoksično dejstvo, bogati su vitaminima, enzimima i biogenskim stimulatorima, te predstavljaju ljekovita sredstva za ovu bolest.

CRVENI VJETAR

Zapaljenje kože sa oteklinama, širećim crvenilom, «geografskim» konturama i bolovima, izazvano streptokokama.

Narodna medicina preporučuje mehlem: list svježeg kupusa se premaže medom i zaliđe na oboljelo mjesto. Mijenja se svaki sat vremena.

ČIREVI

Narodna medicina preporučuje med za liječenje čireva. Ubrzo poslije stavljanja meda, na površinu rane izlazi obilan gnoj i limfa. Gnojna sekrecija i miris postepeno nestaju, rana se osvježava, stimuliše se njena granulacija i epitelizacija. Čireve takođe uspješno liječi i propolis u obliku 20% propolisove masti. Vosak u vidu obloga (zagrijane pločice voska kojim se pokrivaju čirevi) može da svojim dejstvom uništi žarište a ako je u zreлом stadijumu, čir se brzo otvara i gnoj iscuri van. Liječenje svim pčelinjim proizvodima je jako efikasni i traje maksimalno do 12 dana.

ČIR NA DVANAESTOPALAČNOM CRIJEVU

Oralno se uzima med, 3 puta dnevno po 40 g 1-2 sata prije jela, rastvoren u čaši vode ili mineralne vode. Liječenje traje 1-2 mjeseca, a skoro kod svih pacijenata poslije druge nedjelje simptomi nestaju.

Propolis se uzima u vidu 30-40 kapljica 20% alkoholne emulzije propolisa u čaši vode ili mlijeka, 1-2 sata prije jela. Preporučuje se uzimanje oralno polena i matične mlijeci u poznatim dozama.

ČIR NA ŽELUDCU

Karakterišu ga bolovi u želudcu sezonske prirode, obično kada je želudac prazan, bolesnik povraća, podriguje, osjeća gorušicu itd.

Najbolji rezultat se postiže liječenjem medom i propolisom koje traje 20-30 dana. Med (od nane, poljski, livadski) se uzima po 120-130g dnevno u 3 obroka, rastvoren u mlakoj vodi ako je oboljenje praćeno hiperaciditetom (povećano lučenje kiseline), med se uzima 2 sata prije jela a kod hipoaciditeta (smanjeno lučenje kiseline) 30 minuta prije jela. Obično poboljšanje nastaje nakon prve nedjelje i simptomi postepeno prestaju.

Pri liječenju propolisom koristi se 20% vodeni rastvor propolisa, po 1 kašika 3 puta dnevno prijejela ili 20% alkoholno-propolisova emulzija po 20-40 kapljica 3 puta dnevno prije jela, rastvoreno u čaši mlijeka ili vode.

NAPOMENA: Podaci koje možete ovdje pročitati uglavnom se preuzeti iz relevantne literature, najčešće iz knjige Apiterapija, Bugarskog liječnika dr. Mladenova koji je za svoj rad na polju apiterapije bio čak predložen i za Nobelovu nagradu. Pored njegovih djela, korištene su i knjige Nijaza Abadžića, Zvonka Čondića i drugih domaćih autora.

Za liječenje težih bolesti obavezno preporučujemo konsultovanje ljekara, ali je važno napomenuti da pčelinji proizvodi nemaju negativnih uticaja na ljudski organizam izuzev u slučaju preosjetljivosti (alergičnosti) na iste (radi se najčešće o polenu i pčelinjem otrovu)